

به نام خدا



دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

# آزمون کتبی دستیاران روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

۱. کدام یک از علائم زیر در زوال عقل ناشی از HIV دیرتر بروز می کند؟

الف) روان پریشی      ب) اختلال راه رفتن      ج) اختلال حافظه      د) تغییرات شخصیت

۲. بیمار افسرده ای خیلی آهسته و کند صحبت می کند، نام این علامت چیست؟

الف) Bradykinesia      ب) Bradylalia      ج) Alogia      د) Acualia

۳. بر اساس یافته های پژوهش منتشر شده در شماره ۲، No2، ۱۶۹ سال ۲۰۱۲ مجله "American Journal of psychiatry" کدام یک از داروهای زیر احتمال افزایش فشار خون ریوی را بالا می برند؟

الف) آمی تریپتیلین      ب) نفازودون      ج) سرترالین      د) میرتازاپین

۴. کدام یک از خصوصیات سندرم کلین - لوین نمی باشد؟

الف) دوره های تکرار شونده خواب طولانی      ب) بیشتر دخترها و در اواخر دوران نوجوانی دیده می شود  
ج) حالات پرخاشگری و تحریک پذیری      د) دوره های خواب می تواند ۱۸ تا ۲۰ ساعت ادامه یابد

۵. در سندرم وقفه تنفسی انسدادی هنگام خواب (OSA) عوامل مستعد کننده شامل تمامی موارد زیر می شود، بجز؟

الف) هیپرتیروئیدسم      ب) آبنورمالیتی در قسمت های نازوفارینجیال  
ج) جنسیت مرد      د) آکرومگالی

۶. اختلال در علائم حیاتی و خطر مرگ به دنبال مصرف الکل، در چه میزان غلظت الکل در خون رخ می دهد؟

الف) زیر 200mg/dl      ب) بالاتر از 300mg/dl  
ج) این خطر در مقادیر بسیار بالاتر از 1gr/dl روی می دهد      د) مسمومیت الکل با مرگ همراه نمی شود

۷. در سالمندان دچار افسردگی با تظاهرات روانپزشانه کدام یک از موضوعات هذیانی کمتر دیده می شود؟

الف) خودبیمارانگاری      ب) پوچ گرایانه      ج) بزرگ منشی      د) حسادت

۸. در اسکیزوفرنیای دیرآغاز در سالمندان کدام علامت شایعتر است؟

الف) توهم بینایی      ب) هذیان گزند و آسیب      ج) عاطفه سطحی      د) هذیان بزرگ منشی

۹. کدام یک از موارد زیر درباره **normal aging** صحیح است.

الف) بروز مشکلات بهداشتی در سالمندی به ناچار بروز می کند  
ب) بسیاری از بیماری هایی مانند سرطان ها، دمانس که در سالمندی بروز می کند ناشی از normal aging است  
ج) بسیاری از بیماریها در سالمندان در نتیجه pathological process است  
د) دیدگاه و رفتار سالمندان با جوانان تفاوتی ندارد

۱۰. کدام یک از موارد زیر دربارهٔ اثر استفاده از موسیقی در سامندان غلط است.

- الف) شنیدن موسیقی از مثبت بر درمان دمانس دارد  
ب) شنیدن موسیقی می‌تواند Agitation بیماران دمانس را کم می‌کند  
ج) تاثیرات دراز مدت موسیقی در دمانس ناشناخته است  
د) شنیدن موسیقی قبل از خواب به خواب بهتر بیماران دمانس کمک می‌کند

۱۱. خانم ۷۱ ساله مبتلا به اختلال دوقطبی که در فاز مانیا در بیمارستان بستری شده است تحت درمان با لیتیوم قرار

گرفته است. کدامیک از گزینه های زیر در مورد تجویز لیتیوم صحیح می‌باشد؟

- الف) دوز مورد نیاز لیتیوم برای درمان این بیمار معادل دوز درمانی بزرگسالان جوان می‌باشد  
ب) لیتیوم در بیماران این گروه سنی که مبتلا به اختلال شناختی نیز می‌باشند می‌تواند انتخاب ارجح باشد  
ج) افزودن نورولپتیک به لیتیوم در این بیمار می‌تواند خطر دلیریوم را افزایش دهد  
د) لیتیوم در بیماران این گروه سنی که مبتلا به پارکینسون نیز می‌باشند انتخاب ارجح می‌باشد

۱۲. کدام یک از بیماریهای زیر بیشترین علت غیبت شغلی ناشی از بیماریهای روانی است؟

- الف) افسردگی      ب) اضطراب      ج) PTSD      د) اسکیزوفرنیا

۱۳. کدام یک از موارد زیر دربارهٔ دوپامین صحیح است؟

- الف) دژنره شدن nigrostriatal منجر به اختلالات عددی می‌شود  
ب) مسیرهای اصلی دوپامین عبارتند از: نروکورتیکال، توبروانفندیوس، نیگرواستریاتال  
ج) دوپامین در motor control نقش ندارد  
د) عوارض خارج هرمی داروهای آنتی سایکوتیک ناشی از بلوک دوپامین در مسیر نروکورتیکال است

۱۴. در برخورد با بیمار بی‌قرار در اورژانس، در اولین اقدام درمانی:

- الف) اولین خط درمان تجویز هالوپریدول عضلانی همراه با بی‌پریدین است  
ب) تجویز خوراکی ریسپریدون همراه با ۱ میلیگرم لورازپام خوراکی است  
ج) زیپراسیدون عضلانی با دوز ۵ میلیگرم  
د) اولین اقدام همواره تجویز داروی تزریقی است

۱۵. خانم ۴۵ ساله ای به علت درد پشت که دلیل مشخصی برای آن پیدا نشده، از بخش ارتوپدی به شما ارجاع شده است.

او که کارمند بایگانی یک اداره است از چندماه قبل مکرراً به خاطر این درد از مرخصی استفاده کرده است. علاوه بر آن احساس ضعف و خستگی، کم خوابی و اضطراب هم شکایت می‌کند. با توجه به تشخیص احتمالی بیمار کدام دارو را کمتر تجویز می‌کنید؟

- الف) فلوکستین      ب) دولوکستین      ج) پره‌گابالین      د) کلونازپام

۱۶. اگر ضایعه ایجاد کننده صرع ناقص در ناحیه **medobasal temporal** باشد، کدام "آنورا" را ایجاد نمی‌کند؟

- الف) dysmnesic      ب) cognitive      ج) affective      د) dysphasic

۱۷. بیماری دچار صرع لب‌تمپورال است کدامیک از موارد زیر کمتر در این بیماران دیده می‌شود؟

- الف) افسردگی      ب) hypo sexuality      ج) hostility      د) hyper religiosity

۱۸. مراجعی دچار حملات غیر تشنجی تمارضی است کدامیک از علائم زیر به تشخیص این بیماری کمک می‌کند؟

- (الف) نداشتن سابقه روانپزشکی  
(ب) مرد بودن  
(ج) با تلقین حملات شروع می‌شود  
(د) حملات تحت کنترل مراجع است

۱۹. بیماری به علت تصادف و ضربه مغزی دچار اختلال در فعالیت‌های اجرایی مانند ناتوانی در تنظیم اهداف، ناتوانی در برنامه ریزی و ناتوانی در اجرای برنامه‌های خود شده است. به نظر شما کدامیک از مناطق مغزی زیر بیشتر احتمال دارد تخریب شده باشد؟

- (الف) لوب فرونتال  
(ب) لوب تمپورال  
(ج) لوب پارشیال  
(د) سیستم لیمیک

۲۰. مرد ۵۰ساله‌ای به علت شکایت از یکسری حرکات بدون ریتم، تصادفی و با دامنه کم در بدن خود به درمانگاه روانپزشکی مراجعه می‌کند. مشکل حرکتی او با کدام گزینه زیر هماهنگ است؟

- (الف) تیک  
(ب) کره  
(ج) میوکلنوس  
(د) آکینزی

۲۱. بیمار ۶۰ساله‌ای با لرزش دست همراه با کندی حرکت اندام و سابقه مصرف ۱۰ساله تری‌فلوپرازین به درمانگاه روانپزشکی ارجاع می‌شود. روانپزشک با دست خود که در خارج از زاویه دید بیمار قرار گرفته است چند ضربه پشت سر هم به تناوب یک ثانیه‌ای به ناحیه گلابلای او می‌زند. عدم خو گرفتن به این ضربه و ادامه پلک زدن با کدام مورد زیر مطابقت دارد؟

- (الف) myersons sign  
(ب) hoffmanns sign  
(ج) grasp  
(د) avoidance

۲۲. مرد ۵۰ساله‌ای از حدود ۲۰سال پیش به فواصل زمانی ۱ تا ۲ساله دچار حملات سردرد شدید همراه با تعریق شدید یک طرفه پیشانی به میزان ۵ تا ۱۰بار در روز به مدت ۱ تا ۲ماه می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده کدام داروی زیر اثربخشی کمتری در جلوگیری از حملات نسبت به بقیه دارد؟

- (الف) لیتیم کربنات  
(ب) والپروئیک اسید  
(ج) پروپرانولول  
(د) نورتریپتیلین

۲۳. مطالعات ژنتیکی خانوادگی، فرزند خواندگی و دوقلوها درباره خطر اسکیزوفرنیا به مدل توارثی تحت عنوان **polygenic threshold model** اشاره می‌کند که می‌گوید:

- (الف) خطر اسکیزوفرنیا به واسطه اثرات تجمعی ناشی از چند ژن کوچک چندگانه در مکان‌های مختلف است  
(ب) خطر اسکیزوفرنیا به واسطه اثرات اپی ستاتیک تعاملی ژن-ژن افزایش می‌یابد  
(ج) خطر اسکیزوفرنیا، وابسته به تقویت تاثیرات محیطی بر ژنهای مختلف مستعد است  
(د) خطر اسکیزوفرنیا به واسطه توارث یک ژن اصلی منفرد و قوی اعمال می‌گردد

۲۴. کدام عبارت در مورد **postpartum psychosis** صحیح نیست؟

- (الف) prevalence آن ۱-۲٪ است  
(ب) بیشتر با تشخیص اختلال دوقطبی همراه است  
(ج) ریسک خودکشی و نوزادکشی در آن ۵٪ است  
(د) اگر به موقع درمان شود پروگنوز آن خوب است

۲۵. سندرم **shenjing shairuo** معادل کدام یک از عبارات زیر است؟

- (الف) اختلال سایکوسوماتیک  
(ب) نورآستنی  
(ج) فرار مرضی  
(د) اختلال چندشخصیتی

۲۶. ویژگیهای شخصیتی چون مسؤولیت پذیری، هدفمندی، تدبیر اندیشی و انعطاف پذیری به کدامیک از ابعاد شناختی شخصیت مربوط می شود؟

الف) cooperativeness  
ب) self-transcendence  
ج) self-directiveness  
د) self-forgetfulness

۲۷. وقتی در خوابهای شبانه کودک، یک گول حمله کننده نه تنها نماینده پدر وی بلکه بیانگر جنبه‌هایی از وجود مادر یا برخی تکانشهای پرخاشگری اولیه خود کودک است، کدام جنبه رویا مطرح است؟

الف) displacement  
ب) condensation  
ج) projection  
د) regression

۲۸. از دیدگاه بین فردی سالیوان امنیت نتیجه ..... است.

الف) فقدان اضطراب  
ب) احساس کارایی شخصی  
ج) ارضاء نیاز محبت  
د) عدم انزوا در دنیای بالقوه خصمانه

۲۹. از دیدگاه آیزنگ کدام دسته از افراد زیر مستعد اختلالات وسواسی-جبری، اضطراب و افسردگی هستند؟

الف) درونگرایی افراطی  
ب) برونگرایی افراطی  
ج) منبع کنترل برونی افراطی  
د) منبع کنترل درونی افراطی

۳۰. کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی زیر می تواند در هر سه حوزه پسیکوتیک، نوروتیک و انطابقی، توسط فرد بکار گرفته شود؟

الف) projection  
ب) denial  
ج) repression  
د) displacement

۳۱. صفات پاتولوژیک کاراکتر که خود را به صورت حس رقابت جویی و جاه طلبی نمایان می سازد و احتمال جبرانی برای احساس شرم محسوب می شود، به کدامیک از مراحل رشد روانی - جنسی مرتبط است؟

الف) anal stage  
ب) urethral stage  
ج) phallic stage  
د) latency stage

۳۲. پیوند درمانی **therapeutic alliance** در پروسه آنالیز، کدام ویژگی را در خود ندارد؟

الف) بخشی از اعمال ایگوی بیکار در یک رابطه کاری با درمانگر هم پیمان می شود  
ب) همانندسازی مثبت بیمار با درمانگر، در جهت اصلاح دفاعهای پاتولوژیک روی می دهد  
ج) مسؤولیت پذیری و اقتدار، بخشی از المانهای آن محسوب می شود  
د) درمانگر یک مشاهده گر خنثی به حساب می آید و ورودی به تفسیر و معنای تجارب و رفتار بیمار ندارد

۳۳. قرار است به یک فرد چاق یاد بدھیم چطور با کنترل شخصی، رفتار درست خوردن را یاد بگیرد. او پس از دو هفته پایش رفتار خوردن متوجه می شود هر چه بیشتر پیاده روی می کند به احتمال کمتر می خورد. این اقدام مربوط به کدام مرحله کنترل شخصی است؟

الف) self-monitoring  
ب) self-evaluation  
ج) self-reinforcement  
د) self-stimulus control

۳۴. دادن شکلات به کودک در برخی مواقعی که او اتاقش را جمع می کند نمونه ای است از تقویت .....

الف) فاصله ای ثابت  
ب) فاصله ای متغیر  
ج) نسبی ثابت  
د) نسبی متغیر

۳۵. خانم ۲۸ ساله ای با شکایت شستشوی مداوم بدن به منظور جلوگیری از ورود میکروب مراجعه کرده است. اجرای کدام یک از مقیاسهای زیر را برای وی پیشنهاد می کنید؟

BAI(الف) BDI-II(ب) YBOCS(ج) SPAI(د)

۳۶. آرش تا زمانی که وارد گروه نشده بود واقعاً نمی دانست که چطور بدون قطع کردن حرف دیگران، منظورش را بیان کند. وقتی وارد گروه شد با مشاهده سه - چهار نفر که به راحتی این کار را انجام می دادند، سعی کرد این رفتار را تمرین کند. از کدام یک از عوامل درمانی اشتراکی گروه درمانی استفاده شد؟

imitation(الف) inspiration(ب) contagion(ج) corrective familial experience(د)

۳۷. درمانگر ژنوگرام خانواده را رسم می کند تا تاریخچه خانواده و روابط آنها را نشان دهد. درباره فرآیند بین نسلی خانواده کنکاش می کند و به عنوان مربی سعی می کند تفرد ایجاد کند، مثلث زدایی کند و اضطراب را کاهش دهد. وی طرفدار کدام رویکرد خانواده درمانی است؟

bowen family system(الف) strategic(ب) structural(ج) trans generational(د)

۳۸. بیمار ۱۷ ساله ای با تشخیص آنورکسیا معتقد است که هر افزایشی در میزان خوردن قطعاً به چاقی می انجامد. وی دارای کدام خطا شناختی است؟

selective abstraction(الف) overgeneralization(ب)  
negative prediction(ج) all-or-none thinking(د)

۳۹. STDP در درمان همه اختلالات زیر کاربرد دارد بجز:

adjustment disorder(الف) narcissistic personality disorder(ب)  
generazied anxiety disorder(ج) borderline personality disorder(د)

۴۰. درمانگر با بیمار ۲۲ ساله ای برای درمان قرارداد می بندد که برای یک سال در درمان بمانند، تمام جلسات درمان را حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور پیاپی جلسات، درمان به پایان برسد. درمانگر نیز متعهد می شود که به صورت تلفنی در دسترس بیمار باشد و جلسات حضوری در دسترس باش، رازداری را درباره وی حفظ کند؛ به بیکار احترام بگذارد و درمانی اخلاقی و حرفه ای ارائه کند. این اصول قرارداد حاکی از بکارگیری کدام درمان است؟

ACT(الف) DBT(ب) CBT(ج) ISTOP(د)

۴۱. درمانگر طی ۲۰ جلسه به درمان بیمار مبتلا به بولیمیا می پردازد. هدف وی بهبود روابط بین فردی فعلی بیمار به منظور کاهش رفتارهای بیمارگونه خوردن بود. وی از کدام شیوه درمانی استفاده کرده است؟

ISTOP(الف) IPI(ب) ACT(ج) postive psychotherapy(د)

۴۲. کدام گزینه درباره استفاده از هیپنوز در درمان افسردگی صحیح است؟

الف) پژوهشگران تاثیر هیپنوتراپی در افسردگی معادل CBT می دانند  
ب) در مواردی هیپنوز به همراه DBT بیش از درمانهای سنتی موثر بوده است  
ج) هیپنوز می تواند به عنوان یک روش الحاقی به رویکردهای دارویی در بیماران افسرده به کار رود  
د) هیپنوز تاثیر درمانی در افسردگی ندارد و صرفاً در جهت رد تشخیص های افتراقی به کار می رود

۴۳. در گروه درمانی خودیاری **self help** فاکتورهای درمانی اصلی عبارتند از:

الف) cohesion-catharsis-family replay

ب) cohesion-universality-education

ج) empathy-catharsis- education

د) insight- universality – reality testing

۴۴. در اختلال انفجاری متناوب:

الف) در افراد با اختلال شخصیت ضداجتماعی یا مرزی قابل تشخیص گذاری همزمان نیست  
ب) خشونت کلامی را در تحقیقات مربوط به IED (اختلال انفجاری متناوب) جزء این رفتار به حساب نمی‌آورند  
ج) صدمه به اوربیتو فرونتال "چشمی پیشانی" منجر به ظهور خشونت می‌گردد  
د) در صورت وجود صدمات جدی مغزی تشخیص IED را می‌توان براحتی مطرح نمود

۴۵. کدام بیماری فقط در حوزه اختلال کنترل تکانه Nos قرار می‌گیرد؟

الف) استفاده وسواس گونه از اینترنت

ب) کندن پوست

د) خرید وسواس گونه

ج) رفتار جنسی وسواس گونه

۴۶. در مورد **kleptomania** "دزدی بیمار گونه" کدام عبارت صحیح است؟

الف) در مرد و زن به یک اندازه شیوع دارد

ب) اختلال در عملکرد اجرایی executive function وجود دارد

ج) در این بیماران تنهای عصبی- روانشناختی مشکلات فراوانی دارد

د) درمان اختصاصی آن توپیرامات و نالترکسان است

۴۷. خانم ۳۰ ساله‌ای از طرف متخصص پوست به دلیل ترک خوردگیهای مقاوم به درمان در پوست دست ارجاع شده است.

بیمار در حین مصاحبه دستکش به دست دارد و وقتی از او خواسته می‌شود که آنها را درآورد، دائماً مراقب است که

دستهایش به جایی نخوردند. با توجه به تشخیص احتمالی کدام غلط است؟

الف) شیوع بیماری ۲ تا ۳ درصد تخمین زده شده است.

ب) کمتر از ۱۰٪ بیماران معیارهای سندروم توره را دارند.

ج) در صورت شروع بیماری بعد از سی سالگی باید از نظر احتمال بیماری نورولوژیک بررسی شود.

د) همراهی بیماری با ADHD نادر است.

۴۸. مرد ۵۰ ساله‌ای مدام فکر می‌کند که دست‌هایش آلوده به میکرب است و بیش از صدبار دستانش را در طی شبانه‌روز

می‌شوید. او اظهار می‌دارد براساس عادت این کار را می‌کنم، از طرفی با این کار اضطرابم کم می‌شود ولی خودم را سرزنش

می‌کنم و احساس گناه هم پیدا می‌کنم. کدامیک از صحبت‌های او خصوصیت کلیدی یک **Compulsion** است؟

ب) با این کار اضطرابم کم می‌شود.

الف) براساس عادت این کار را می‌کنم.

د) احساس گناه هم پیدا می‌کنم.

ج) خودم را سرزنش می‌کنم.

۴۹. پدیده ژنتیکی **Anticipation** در کدامیک از اختلالات زیر دیده نمی‌شود؟

د) عقب‌ماندگی ذهنی X شکننده

ج) سندرم پرادریلی

ب) اختلال دوقطبی

الف) بیماری هانتینگتون

۵۰. در مورد اقدام به خودکشی در بیماران افسرده کدام جمله صحیح است؟

- (الف) سؤال کردن در مورد خودکشی، ممکن است آنها را به سمت خودکشی راهنمایی کند.  
(ب) تمام بیمارانی که افکار خودکشی دارند، به طور مستقیم در مورد آن صحبت می کنند.  
(ج) برنامه ریزی برای "مردن"، نشانه احتمال اقدام به خودکشی نیست.  
(د) گاهی تمایل به خودکشی به صورت انجام رفتارهای خطرناک بیان می شود.

۵۱. کدامیک جزء اختلال افسردگی NOS در DSM نیست؟

- (الف) premenstrual Dysphoric Dis  
(ب) Atypical Depression  
(ج) Minor Depressive Dis  
(د) Recurrent Brief Depressive Dis

۵۲. کدامیک از عوامل زیر در ایجاد دلیریوم در افراد مبتلا به سرطان نقشی ندارد؟

- (الف) انسفالوپاتی متابولیک  
(ب) تومورهای تیروئید پاراتیروئید و آدرنال  
(ج) تجویز دگزامتازون  
(د) عفونت در افراد دچار نقص ایمنی

۵۳. کدام بیماری در مورد درمان Dissociative Identity Disorder با ECT صحیح نیست؟

- (الف) درمان با ECT باعث بدتر شدن این بیماران می شود.  
(ب) درمان با ECT باعث تخفیف علائم افسردگی مقاوم به درمان در آنها می شود.  
(ج) درمان با ECT باعث بدتر شدن مشکلات حافظه تجزیه ای نمی شود.  
(د) درمان با ECT بیشتر به شکل یک افسردگی دوپل به این نوع درمان است.

۵۴. کدام عبارت در مورد gunser syndrom صحیح نیست؟

- (الف) در سال ۱۸۸۱ تعریف شد.  
(ب) قبلاً در اختلال ساختگی طبقه بندی می شد.  
(ج) در این اختلال paralogia وجود دارد.  
(د) معمولاً همراه با Cloucling of consciousness است.

۵۵. کدامیک محور اصلی در اختلالات تجزیه ای (Dissociative) است؟

- (الف) اختلالات حرکتی  
(ب) اختلالات حسی  
(ج) اختلالات حافظه  
(د) اختلال در عملکرد جسمانی

۵۶. کدامیک از موارد زیر در زمان کودکی بیماران مبتلا به eating disorder کمتر دیده می شود؟

- (الف) اختلالات خلقی و اضطرابی  
(ب) اختلال بیش فعالی کم توجهی ADHD  
(ج) OCD (اختلال وسواسی جبری)  
(د) خصوصیات اولیه شخصیت وسواسی جبری در زمان کودکی

۵۷. کدامیک از ملاکهای تشخیصی DSM IV TR برای بی اشتهايي عصبی مطرح نمی باشد؟

- (الف) ترس شدید از افزایش وزن.  
(ب) اختلال در ارزیابی وزن و انکار وخامت وزن پایین فعلی.  
(ج) اختلال در قاعدگی در دخترانی که به سن بلوغ رسیده اند.  
(د) اختلال در قاعدگی حتی در تجویز استروژن هم ادامه می یابد.

۵۸. کدامیک از موارد زیر در اختلال ساختگی کمتر توسط بیمار استفاده می شود؟

- (الف) بیان دراماتیک گونه از علائم بیماری خود  
(ب) مبالغه در نمایش علائم بیماری خود  
(ج) احساس راحتی و آرامش در زمان بستری در بیمارستان  
(د) حالات پر خاشگري نسبت به پرسنل بیمارستان



۵۹. مرد ۳۴ ساله مجری با علامت خونریزی گوارشی از بخش گوارش به روانپزشکی ارجاع می‌شود. متخصصان گوارش پس از بررسیهای تشخیصی فراوان علت یا تشخیص قاطعی برای آن پیدا نکرده‌اند و بیمار به درمانهای آنها پاسخی نداده است. مراجع از همان ابتدا با ارجاع به روانپزشک مخالف بوده و در طول بستری در بخش روانپزشکی نیز همچنان معترض است که چرا با وجود خونریزی گوارشی در این بخش است. سرانجام بعد از مطرح شدن تشخیص روانپزشکان از آنها و نیز از متخصصان گوارش بیمارستان به مراجع قضایی شکایت می‌کند. با توجه به تشخیص احتمالی بیمار احتمال مرگ او چقدر است؟

(د) ۸۰٪

(ج) ۵۰٪

(ب) ۲۰٪

(الف) ۲٪

۶۰. کدامیک از موارد زیر از انواع مدل‌های بیماری نیست؟

(د) Conflict

(ج) Magical

(ب) Religious

(الف) Moral

۶۱. کدامیک در مورد **Premature Ejaculation** صحیح نیست؟

(الف) در مردان تحصیل کرده بیشتر دیده می‌شود.

(ب) حدود ۳۰٪ از جامعه مردان مبتلا به این اختلال هستند.

(ج) اضطراب و Ejaculation هر دو توسط سیستم پاراسمپاتیک کنترل می‌شوند.

(د) کمال‌گرایی در مورد عملکرد Sexual در اتیولوژی آن وجود دارد.

۶۲. در مورد اختلال **Hypoactive sexual desire** کدام جمله صحیح است؟

(الف) این اختلال معمولاً پس از میانسالی شروع می‌شود و ماندگار است.

(ب) این اختلال معمولاً از دوران بلوغ شروع شده و ماندگار است.

(ج) این اختلال اصولاً زمینه جسمانی دارد.

(د) افراد مبتلا معمولاً قدرت ego ضعیف دارند.

۶۳. دیس فوریا بعد از مقاربت:

(الف) در زنان شایعتر از مردان است.

(ب) درمان آن همانند درمان خلق دیسفوریک با دارو و CBT است.

(ج) غالباً از فاز Arousal (برانگیختگی) جنسی شروع به تولید علائم می‌کند.

(د) بستگی به نگرش فرد به مسائل جنسی در کل و خصوصاً به شریک جنسی خود دارد.

۶۴. فردی که در هنگام تولد ظاهر دخترانه داشته و در هنگام بلوغ هویت جنسی مذکر پیدا می‌کند کدامیک از بیماریهای

زیر بیشتر برای او مطرح می‌باشد؟

(د) کمبود ۵ آلفا ردوکتاز

(ج) هیپریلازی مادرزادی آدرنال

(ب) سندرم کلاین فلتز

(الف) سندرم ترنر

۶۵. در ایجاد **Erection** کدامیک از نوروترانسمیترهای زیر نقش بیشتری دارد؟

(د) دوپامینرژیک

(ج) سروتونرژیک

(ب) آدرنرژیک

(الف) کولینرژیک

۶۶. خانم ۳۰ ساله‌ای با خلق افسرده، کم‌خوابی، احساس بی‌ارزشی و افکار خودکشی توسط همسر خود به مطب روانپزشکی مراجعه می‌کند. در مصاحبه اولیه، سابقه‌ای از احساس نشاط بیش از حد همراه با ولخرجی و افزایش تمایلات مذهبی به دست آمد ولی مورد توجه قرار نگرفته بود. مناسب‌ترین درمان تجویزی کدام است؟

الف) بوپروپیون      ب) دولکستین      ج) لیتیم کربنات      د) کاربامازپین

۶۷. بیمار مردی است ۳۶ ساله که پس از وقوع یک دوره علائم خلق بالا، پرحرفی، افزایش میل جنسی و عدم تمرکز و اعتقاد به این که به رسالت مبعوث شده است از سال قبل تحت درمان با داروهای کربنات لیتیم و اولانزاپین قرار دارد و در هفته‌های اخیر هنگام غذاخوردن و نوشتن دست‌هایش بوضوح می‌لرزد، کدام دارو در درمان او مؤثر است؟

الف) آمانتادین      ب) تری‌هگزی فنیدیل      ج) توپیرامات      د) پریمیدون

۶۸. آقای ۳۰ ساله مبتلا به اسکیزوفرنیا پس از تغییر دارو دچار تب، سفتی عضلانی، نوسان فشار خون و کاهش سطح هوشیاری شده است. کدامیک از داروهای زیر در درمان او مؤثر نیست؟

الف) لوودوپا - کربی دوپا      ب) بنزودیازپین      ج) کاربامازپین      د) آمانتادین

۶۹. کدامیک از داروهای زیر در نوع متوسط تا شدید آلزایمر مؤثر است؟

الف) تاکرین      ب) ممانتین      ج) گالانتامین      د) ریواستگمین

۷۰. خانم ۳۰ ساله، با سابقه اختلال دوقطبی و تحت درمان با درمان نگهدارنده لیتیم، ناخواسته باردار شده است و از زمان آگاه شدن به این امر، دچار افسردگی شدید، بی‌خوبی و آژیتاسیون است دلیل به خودکشی دارد، با توجه به عوارض جانبی لیتیم در سه ماهه اول بارداری، چه اقدام درمانی را توصیه می‌کنید؟

الف) کم کردن دوز لیتیم و تجویز فولات      ب) تغییر دادن دارو به سدیم والپرات  
ج) قطع لیتیم و تجویز پاروکستین      د) قطع لیتیم و تجویز ECT

۷۱. کدامیک از داروهای زیر به طور مستقیم با گلوکوکورتیکوئیدها سیون دفع می‌شود؟

الف) دیازپام      ب) آلپرازولام      ج) اکسازپام      د) کلونازپام

۷۲. کدامیک از این داروها خاصیت آنتی‌هیستامینرژیک ندارد؟

الف) دوکسپین      ب) لوراتادین      ج) سیپروهپتادین      د) متیل سرژید

۷۳. کدامیک از تأثیرات کاربامازپین سریع‌تر از بقیه شروع می‌شود؟

الف) Anti nociceptive      ب) Anti mania      ج) Anti insomina      د) Anti depressant

۷۴. بیشترین مورد استفاده مهارکننده‌های کولین استراز کدامیک از موارد زیر است؟

الف) اختلالات شناختی ناشی از اختلالات عروقی مغز      ب) اختلالات شناختی ناشی از بیماری آلزایمر  
ج) اختلالات شناختی ناشی از افزایش سن      د) پیشگیری از بروز اختلالات شناختی و آلزایمر

۷۵. در مورد مونوآمین اکسیدازهای قابل برگشت و غیرقابل برگشت؛ کدام عبارت صحیح است؟

الف) غالباً خط اول درمان برای افسردگی‌های مزمن می‌باشند.

ب) غالباً افرادی که در کودکی سابقه اختلال کمبود توجه به تمرکز داشته‌اند؛ در افسردگی بزرگسالی به درمان به Tranylcypromine پاسخ خوبی می‌دهند.

ج) در درمان افسردگی دوقطبی؛ تبدیل شدن به مانیا با درمان، با مونوآمین اکسیدازهای غیرقابل برگشت دیده نمی‌شود.

د) شکل دارویی چسب پوستی سلژیلین موجب افزایش خطر فشارخون می‌گردد.

۷۶. شیرخوار سه ماهه‌ای دارای این خصوصیات می‌باشد: توان سازگاری پایین، ریتم نامنظم خواب و غذا، و آستانه پایین

در پاسخ‌دهی به تحریکات محیطی، طبق تقسیم‌بندی Thomas & Chess این کودک از لحاظ مزاج (Temperament)

در کدام دسته طبقه‌بندی می‌شود؟

الف) Slow to warm up (ب) Easy (ج) Difficult (د) Behavioral inhibited

۷۷. کدامیک از علائم زیر را کودکان بیشتر از والدین گزارش می‌کنند؟

الف) restlessness (ب) suicidal thought (ج) aggression (د) impulsiveness

۷۸. پدیده نرمال‌سازی (Normalization) در عقب‌ماندگی ذهنی به چه معناست؟

الف) نرمال به حساب آوردن افراد عقب‌مانده ذهنی.

ب) تفاوتی بین افراد نرمال و عقب‌مانده ذهنی از نظر قانونی نیست.

ج) نرمال‌سازی یعنی هیچ کودک عقب‌مانده‌ای در مؤسسات باقی نماند.

د) شیوه زندگی آنها از نظر ریتم روزانه، هفتگی و سالیانه نرمال شود.

۷۹. در کدامیک از علائم زیر به عنوان نشانه‌های اصلی اختلال written expression نادرست است؟

الف) ناتوانی در یادداشت‌برداری در کلاس

ب) وجود اشتباهات مربوط به دستور زبان در نوشته‌ها

ج) وجود اشتباهاتی از قبیل نگذاشتن نقطه کلمات یا تشدید در دیکته

د) ناتوانی در تصحیح یک نوشته

۸۰. پسری ۴ ساله با شنوایی طبیعی فقط قادر به بیان ۷-۶ کلمه می‌باشد. کلمات را به صورت مناسب به کار می‌برد. از

اشاره و ژست برای رساندن منظور خود استفاده می‌کند و از بازی با اسباب‌بازی‌های خود لذت برده و در بازی با بچه‌های

دیگر شرکت می‌کند. کدامیک از موارد زیر برای وی مطرح است؟

الف) طیف طبیعی رشد (ب) اختلال اوتیسم (ج) اختلال مخلوط زبان بیانی - دریافتی (د) اختلال زبان بیانی

۸۱. کدامیک از موارد زیر در مورد توزیع جنسی کودکان اوتیستیک صحیح است؟

الف) شیوع این اختلال در پسرها بیشتر از دخترهاست اما در دخترها احتمال عقب‌ماندگی ذهنی بیشتر است.

ب) شیوع این اختلال در پسرها بیشتر از دخترهاست اما در پسرها احتمال عقب‌ماندگی ذهنی بیشتر است.

ج) شیوع این اختلال در دخترها بیشتر از پسرهاست اما در دخترها احتمال عقب‌ماندگی ذهنی بیشتر است.

د) شیوع این اختلال در دخترها بیشتر از پسرهاست اما در پسرها احتمال عقب‌ماندگی ذهنی بیشتر است.

۸۲. کودکی که به علت ابتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی (ADHD) تحت درمان با متیل فنیدیت (ریتالین) به صورت ۱ عدد صبح و ۱ عدد ظهر می‌باشد، عصرها دچار تشدید علائم رفتاری و بیقراری می‌شود. کدام پیشنهاد درمانی برای رفع عارضه فوق مناسب نمی‌باشد؟

الف) استفاده از محرک‌های طولانی اثر

ب) تجویز دوز کم ریتالین در عصرها

ج) توضیح این مسئله به خانواده که شدت این حالت ممکن است در روزهای مختلف متفاوت باشد.

د) تجویز SSRI

۸۳. کدامیک از موارد زیر جزء عوارض شایع محرک‌ها نمی‌باشد؟

الف) کاهش اشتها

ب) افزایش تأخیر در به خواب رفتن

ج) تیک‌های حرکتی

د) سردرد

۸۴. نوجوان ۱۳ ساله‌ای با علائم اختلال دوقطبی (فاز مانیا) از ۶ ماه قبل مراجعه نموده است. در شرح حال اخذ شده، نامبرده به طور همزمان مبتلا به ADHD نیز می‌باشد. در درمان این نوجوان کدام رویکرد درمانی صحیح است؟

الف) فقط نیاز به تجویز داروی تثبیت کننده خلقی می‌باشد و تجویز ریتالین لزومی ندارد.

ب) باید به طور همزمان داروی تثبیت کننده خلقی و ریتالین تجویز شود.

ج) بهتر است ابتداء با داروی تثبیت کننده، علائم خلقی کنترل شود و سپس ریتالین تجویز گردد.

د) تجویز ریتالین به تنهایی برای درمان هر دو اختلال کفایت می‌کند.

۸۵. کدامیک از موارد زیر جزء فاکتورهای محافظت کننده در برابر اختلال سلوک نمی‌باشد؟

الف) نمره هوش بالاتر

ب) کارکرد تحصیلی بهتر

ج) مزاج آسان تر

د) برانگیختگی اتونوم کمتر

۸۶. دانش آموزی مکرراً اقدام به پرخاشگری و تعدی به حقوق دیگران، فرار از منزل، حیوان آزاری، دروغگویی و فرار از مدرسه میکند. برای تشخیص اختلال سلوک در وی وجود کدامیک از معیارهای زیر ضروری نمی‌باشد؟

الف) حداقل ۳ علامت در ۱۲ ماه گذشته وجود داشته باشند.

ب) حداقل یکی از علائم در ۶ ماه گذشته وجود داشته باشد.

د) شروع فرار از مدرسه باید قبل از ۱۳ سالگی باشد.

ج) سن بیمار کمتر از ۱۸ سال باشد.

۸۷. پسر ۱۰ ساله‌ای از ۲ سال قبل دچار تیک‌های حرکتی متعدد به همراه تیک‌های صوتی شده است. در ارزیابی روانپزشکی انجام شده، اختلال دگری در وی مشاهده نگردید. کدامیک از داروهای زیر در درمان تیک وی مؤثر نمی‌باشد؟

الف) ریسپریدون

ب) گوانفاسین

ج) فلوکستین

د) هالوپریدول

۸۸. شایعترین اختلالی که بصورت کوموریبه با Enuresis وجود دارد کدام است؟

الف) ADHD

ب) اختلال اضطراب منتشر

ج) اختلال افسردگی اساسی

د) OCD

۸۹. برای تشخیص گذاری Reactive attachment disorder براساس DSM-IV-TR، شروع اختلال باید قبل از چه سنی باشد؟

الف) ۲ سالگی

ب) ۳ سالگی

ج) ۴ سالگی

د) ۵ سالگی

۹۰. در افتراق اختلال دوقطبی از ADHD، کدامیک از علائم زیر کمک کننده ترند؟

الف) بزرگ منشی

ب) پرفعالیتی

ج) حواسپرتی

د) پر حرفی

۹۱. شایعترین هم‌ابتلائی (Comorbidity) در اختلال وسواسی - جبری کودکان کدام است؟  
الف) ADHD (اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی)      ب) سایر اختلالات اضطرابی  
ج) اختلالات خلقی      د) اختلال تیک

۹۲. در نوجوان مبتلا به سایکوز که از چاقی مفرط نیز رنج می‌برد مصرف کدامیک از داروهای زیر مناسب‌تر است؟  
الف) Ziprasidone      ب) Clozapine      ج) Olanzapine      د) Risperidone

۹۳. هشدار FDA (سازمان غذا و دارو) در مورد مصرف دسموپرسین در درمان شب‌ادراری در جهت پیشگیری از کدام عارضه می‌باشد؟

الف) عوارض هدایتی قلبی      ب) نارسایی کلیوی      ج) هیپوناترمی و تشنج      د) نارسایی کبدی

۹۴. کودکی ۷ ساله که در کلاس اول درس می‌خواند طی ۲ ماهی که از آغاز سال تحصیلی گذشته، در مدرسه دچار نگرانی مداوم و شدیدی می‌گردد. هنگام جداسدن از والدین دچار ترس و وحشت شدیدی می‌شود و در این مدت چندبار بدلیل درد شکم و تهوع به مدرسه نرفته است. کدامیک از موارد زیر بعنوان خط اول درمان توصیه نمی‌شود؟  
الف) درمان شناختی - رفتاری      ب) فلووکسامین      ج) آلپرازولام      د) فلوکستین

۹۵. در اسکیزوفرنی با شروع زودهنگام (در مقایسه با مواردی که در بزرگسالی آغاز می‌شود)، کدام مورد اشتباه است؟  
الف) آسیب‌پذیری ژنتیک در این موارد برجسته‌تر است.  
ب) در اغلب موارد مشکلات اجتماعی و توجهی در اوایل کودکی وجود دارد.  
ج) احتمال بهبودی سریع‌تر از موارد اول بیشتر است.  
د) سیر اختلال، مزمن‌تر است.

۹۶. کدام اختلال جسمی‌شکل (سوماتوفرم) در طبقه‌بندی DSM-IV وجود دارد که در طبقه‌بندی ICD-10 به صورت یک طبقه مستقل وجود ندارد؟  
الف) اختلال خودبیمارانگاری (هیپوکندریازیس)      ب) اختلال درد سوماتوفرم  
ج) ضعف عصبی (نوراستنی)      د) اختلال کژدیسه‌تنی body dysmorphic disorder

۹۷. فردی که مطابق ارزیابی شما به طور پیوسته و شدید در خطر صدمه زدن به خود قرار دارد، در مقیاس ارزیابی کلی کارکرد (Global Assessment of Functioning (GAF)) حدوداً چه نمره‌ای می‌گیرد؟  
الف) صفر تا ۱۵      ب) ۲۵ تا ۳۵      ج) ۵۰ تا ۶۰      د) ۸۰ تا ۱۰۰

۹۸. مرد ۲۵ ساله ای از هفت ماه پیش به دنبال از اخراج از محل کار خود دچار احساس افسردگی، کم‌خوابی، کاهش اعتماد به نفس و تمایلات خودکشی شده است. بعد از دو هفته تلاش شغل جدیدی پیدا می‌کند که موقعیت پائین‌تری دارد ولی تاکنون مسئول مستقیم او از عملکردش رضایت داشته است. بدون آن که خانواده‌ی او متوجه شوند به روانپزشک مراجعه می‌کند. اولین تشخیص شما کدام است؟  
الف) اختلال افسردگی عمده      ب) اختلال افسردگی جزئی      ج) اختلال انطباقی      د) اختلال افسردگی NOS

۹۹. پس از یک دوره ۲ ساله پسرفت تحصیلی و بین فردی، یک آقای ۲۱ ساله ناگهان عقیده پیدا کرد که یک خواننده ویژه رادیو از صدای او استفاده می‌کند. او نمی‌توانست توضیح دهد چرا و چگونه چنین عقیده‌ای پیدا کرده است؟  
الف) عقیده ایشان یک partial delusion است.  
ب) این مرد نوعی primary delusion دارد.  
ج) در حال تجربه delusional mood است.  
د) نمی‌تواند چنین تفکر ناگهانی شکل بگیرد.

۱۰۰. درباره نقش استرسورهای اجتماعی در اختلالات خلقی، کدام گزینه غلط است؟  
الف) رابطه استرسورهای حاد و شروع بیماری، بطور پیشرونده با افزایش تعداد اپی‌زودها، قوی‌تر می‌گردد.  
ب) بیمارانی که خطر بالای ژنتیکی برای اختلال خلقی دارند، عموماً اپی‌زودهای افسردگی یا مانیا را بدون وجود وقایع زندگی منفی، تجربه می‌کنند.  
ج) در ایجاد اختلالات خلقی عمده، استرسورهای مزمن (بیکاری) نقش مهمتری نسبت به استرسورهای حاد دارند.  
د) این واقعیت که درک ذهنی وقایع زندگی، نقش مهمتری از خود واقعه دارند، برآورد نقش علتی وقایع زندگی را مشکل‌تر می‌سازد.

باسخنامه امتحان کتبی دستیاران - اردیبهشت ماه ۹۲

سوال	الف	ب	ج	د
۵۱				
۵۲				
۵۳				
۵۴				
۵۵				
۵۶				
۵۷				
۵۸				
۵۹				
۶۰				
۶۱				
۶۲				
۶۳				
۶۴				
۶۵				
۶۶				
۶۷				
۶۸				
۶۹				
۷۰				
۷۱				
۷۲				
۷۳				
۷۴				
۷۵				
۷۶				
۷۷				
۷۸				
۷۹				
۸۰				
۸۱				
۸۲				
۸۳				
۸۴				
۸۵				
۸۶				
۸۷				
۸۸				
۸۹				
۹۰				
۹۱				
۹۲				
۹۳				
۹۴				
۹۵				
۹۶				
۹۷				

سوال	الف	ب	ج	د
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				

نام و نام خانوادگی:

.....

- با امید به موفقیت تمامی شما عزیزان،  
 لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:
۱. پاسخها حتماً به صورت (X ضربدر) و داخل کادر باشد.
  ۲. پاسخها با خودکار آبی یا مشکی مشخص شود.
  ۳. در صورت مشاهده بیشتر از یک پاسخ برای یک سوال، نمره‌ای به سوال مورد نظر تعلق نخواهد گرفت.

نمره کل:

.....

تأیید مسؤؤل آموزش دستیاران

تأیید مدیر گروه

				၄၈
				၄၉
				၅၀

				၄၈
				၄၉
				၅၀