

به نام خدا



دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

آزمون کتبی دستیاران روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

۱- تصمیم‌گیری در مورد اینکه مصاحبه با بیمار شروع گردد یا با والدین و یا اینکه از ابتدا به صورت توأم (بیمار همراه با والدین) ارزیابی گردند، در کدام گروه سنی بیشتر از همه چالش‌برانگیز است؟

الف) دوره شیرخوارگی ب) دوره نوپایی ج) سنین دبستان د) دوره نوجوانی

۲- کدامیک از ابزارهای ارزیابی زیر براساس مصاحبه طراحی شده است؟

الف) Children Behavior checklist (CBCL) ب) Kiddi-Schedule for affective
ج) Conner's parent Rating Scale (CPRS) د) Children's Depression Inventory (CDI)

۳- سری سؤالات CRAFT جهت غربالگری کدام اختلال در نوجوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف) Low self esteem ب) Substance abuse
ج) Anxiety Disorder د) Eating Disorder

۴- کودک ۸ ساله‌ای دارای اختلال تکلم با این مشخصات می‌باشد: اختلال در fluency به صورت کلام سریع، پایین بودن فهم‌پذیری و کلمات تلسکوپیک مکرر. برای این کودک چه نوع اختلال ارتباطی مطرح می‌باشد؟

الف) Sever Stuttering ب) Clultering
ج) Expressive Language Disorder د) Phonological Disorder

۵- پروگنوز اختلال زبان بیانی - دریافتی اکتسابی در کدامیک از موارد زیر ضعیف‌تر است؟

الف) Encephalitis ب) Poisoning
ج) Cerebral vascular accident د) Landau-Kleffner's syndrome

۶- کدامیک از موارد زیر جزء فاکتورهای محافظتی اختلالات ایدائی (اختلال نافرمانی مقابله جویانه و اختلال سلوک) نمی‌باشد؟

الف) رابطه مناسب کودک - والد ب) سطح هوشی پایین
ج) وضعیت اقتصادی - اجتماعی بالا د) کفایت تحصیلی

۷- کدام علامت در کودکان و نوجوانان ADHD، آنان را درگیر فعالیت‌های خطرناک می‌کند؟

الف) Impulsivity ب) Hyperactivity
ج) Inalntentiveness د) Difficulty with time anagement

۸- این توصیف، مربوط به کدامیک از حوزه‌های Temperament براساس مول جیس و موقاس می‌باشد: "میزان رفتار مثبت در مقایسه با میزان رفتار منفی"

الف) Activity level ب) Rhythmicity
ج) Adaptability د) Quality of Mood

۹- افزایش حجم آمیگدال در کدامیک از اختلالات زیر در کودکان گزارش شده است؟

- (الف) اختلال اضطراب منتشر
(ب) اختلال بیش‌فعالی - کمبود توجه
(ج) اختلال استرس پس از سانحه
(د) اختلال وسواسی - اجباری

۱۰- افزایش حجم ماده خاکستری در کدام ناحیه مغز تا اوایل بزرگسالی نیز ادامه می‌یابد؟

- (الف) پاریتال
(ب) فرونتال
(ج) تمپورال
(د) اکسی پیتال

۱۱- **extraversion و negative affectivity** بالا و **effortful control** پایین، در کدامیک از اختلالات زیر دیده

می‌شود؟

- (الف) اختلال بیش‌فعالی - کمبود توجه
(ب) اختلال افسردگی ماژور
(ج) اختلالات اضطرابی
(د) اتیسم

۱۲- کدامیک از ویژگیهای زیر در سندرم X شکننده نامحتمل است؟

- (الف) صورت کشیده
(ب) گوشهای بزرگ
(ج) قد کوتاه
(د) میکروارکیدسیم

۱۳- کدامیک از مشکلات زیر در سندرم داون شیوع کمتری دارد؟

- (الف) افسردگی
(ب) پرخاشگری
(ج) اشکال در تمرکز
(د) تکانشگری

۱۴- کدامیک از موارد زیر در اختلال بیان نوشتاری صحیح نمی‌باشد؟

- (الف) این اختلال در افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی، تشخیص‌گذاری نمی‌شود.
(ب) معمولاً تشخیص اختلال نوشتن تا قبل از ۸ سالگی مطرح نمی‌شود.
(ج) دستخط بد به تنهایی برای تشخیص‌گذاری کافی نیست.
(د) ممکن است در یک صفحه، یک کلمه به شکل‌های مختلفی نوشته شود.

۱۵- در کودکی با ناروانی کلام (Dysfluency)، کدامیک از موارد زیر به نفع ناروانی طبیعی کلام می‌باشد؟

- (الف) تکرار کلمات و عبارات
(ب) تکرار حروف
(ج) صحبت با فشار و سختی
(د) وجود ناروانی در ۳۰٪ کلام

۱۶- در اختلال فونولوژیک کدام مورد اشتباه است؟

- (الف) در موارد شدید در ۲ سالگی نیز قابل تشخیص است.
(ب) در ارزیابی تشخیصی، تست شنوایی نیز باید انجام شود.
(ج) در ۷۵٪ موارد خفیف تا متوسط، مهارتهای تولید صداهای گفتاری تا ۶ سالگی طبیعی می‌شود.
(د) جهت بهبودی حتی در موارد خفیف نیز درمان ضروری است.

۱۷- در مطالعات تصویربرداری عصبی در اتیسم کدام یافته مشاهده نشده است؟

- (الف) افزایش حجم مخچه
(ب) کاهش فعالیت آمیگدال
(ج) افزایش فعالیت Fusiform gyrus
(د) کاهش حجم کورپوس کاموزوم

۱۸- نوجوان ۱۵ ساله‌ای مکرراً اقدام به پرخاشگری و تعدی به حقوق دیگران، فرار از مدرسه، دزدی و حیوان‌آزاری می‌نماید. برای تشخیص اختلال سلوک شروع کدام علامت باید قبل از ۱۳ سالگی باشد؟
(الف) پرخاشگری و تعدی به حقوق دیگران
(ب) فرار از مدرسه
(ج) دزدی
(د) حیوان‌آزاری

۱۹- در مورد پیکا تمام موارد زیر صحیح است بجز:
(الف) فاکتورهای سایکودینامیک در اتیولوژی این اختلال مطرح هستند.
(ب) سطوح پایین آهن و روی اغلب در این اختلال مشاهده می‌شود.
(ج) در اکثر موارد چند ماه به طول انجامیده و سپس بهبود می‌یابد.
(د) برای تشخیص‌گذاری، علایم باید حداقل ۳ ماه وجود داشته باشند.

۲۰- اختلال دوقطبی در کودکان با کدامیک از اختلالات زیر بیشترین کوموربیدیتی را دارد؟
(الف) اختلال بیش‌فعالی - کمبود توجه
(ب) اختلالات اضطرابی
(ج) اختلال نافرمانی - مقابله جویی
(د) اختلال سلوک

۲۱- مدیریت منابع انسانی وزارتخانه‌ای تصمیم دارد به منظور ارزیابی توانمندی‌های کارکنانش از یک آزمون مناسب استفاده کند. کدامیک از آزمونهای زیر را پیشنهاد می‌کنید؟
(الف) Scl-90 (ب) MBTI (ج) MMPI (د) NEO_PT

۲۲- فردی که در مرحله ابتکار در برابر احساس گناه اریکسون تعارض خود را سخت‌گیرانه حیران افراطی (over compensate) می‌کند، بیشتر مستعد چه بیماری است؟
(الف) علائم سایکوسوماتیک (ب) فوبیا (ج) اختلال تبدیلی (د) سوءمصرف مواد

۲۳- درمانگر معتقد است علت اختلالات هیجانی بیمارش باورهای غلط درباره خودش، دنیا و هدفهای نامناسب است که دور از علاقه اجتماعی سازنده دور می‌کند. این بیمار براساس کدام مدل مفهوم‌سازی شده است؟
(الف) آدلری (ب) ماهرلی (ج) کلاینی (د) لکانی

۲۴- خانواده درمانگری بر روی ابراز هیجان‌ها، دلبستگی‌های آسیب دیده، بهبود احساس‌های هیجانی و الگوهای ارتباطی فعلی تمرکز دارد. وی طرفدار کدام رویکرد خانواده درمانی است؟
(الف) experiential / humanistic (ب) Psychoeducational (ج) Structural (د) Strategic

۲۵- دختر ۲۶ ساله‌ای در جلسه درمان شناختی - رفتاری فکری را ثبت کرده است "من نمی‌توانم نقاش خوبی باشم چون چهره‌ها را خوب نقاشی نمی‌کنم". این در حالی است که وی به همراه استادش در چندین گالری تصاویری از طبیعت، اشیاء بی‌جان یا موقعیتها را در معرض دید عموم قرار داده و با استقبال خوبی مواجه شده است. وی دچار کدام نوع خطای شناختی است؟
(الف) arbitrary interence (ب) dichotomous thinking (ج) selective abstraction (د) overgeneralization

۲۶- احتمال مؤثر بودن IPT (درمان بین فردی) علاوه بر اختلال افسردگی عمده در کدامیک از اختلالات بیشتر است؟

(ب) سوءمصرف مواد

(الف) اختلال اضطراب فراگیر

(د) اختلالات خوردن

(ج) اختلالات شخصیت

۲۷- شیدا دختری ۶ ساله است که وقتی مادرش او را در پیش دبستانی تنها می‌گذارد شروع به گریه می‌کند. معلم وی پیشنهاد می‌دهد در صورتی که سر کلاس بیاید و مادرش هم تا ۵ دقیقه اول کلاس حضور یابد و بعد برود به او یک برچسب می‌دهد و پس از طی این مرحله اگر مادر او را به مدرسه بیاورد و ۱ دقیقه پشت در بیايستد و بعد برود و او گریه نکند به او برچسب می‌دهد و به همین ترتیب... اگر او بخواهد گریه کند باید به دفتر برود و هیچ برچسبی هم نمی‌گیرد و تا پایان ساعت هم باید در دفتر مدرسه بماند. معلم از چه شیوه‌ای استفاده می‌کند؟

(ب) contingency management

(الف) backward chaining

(د) habit reversal training

(ج) shaping

۲۸- روانپزشکی به منظور از بین بردن ترس دختر ۱۶ ساله از حیوانات خزنده با توافق خود او، وی را در معرض حیوانی خزنده قرار داده و راه فرار را برای وی سد می‌کند. وی از کدام روش مواجهه استفاده کرده است؟

(ب) extinction

(الف) flooding

(د) systematic desensitization

(ج) counterconditioning

۲۹- درمانگری قصد دارد از درمان تحلیلی فشرده کوتاه مدت STDP برای درمان استفاده کند. در سوابق بیمار کدامیک از موارد زیر مانع ارائه این درمان می‌گردد؟

(ب) وجود شخصیت اجتنابی قبل بیماری

(الف) وجود سابقه بیش از یک دوره ECT

(د) روان درمانی قبلی جواب نداده

(ج) وجود افکار خودکشی

۳۰- در سایکودراما، بیمار به بیرون از صحنه رفته و موقعیت زندگی خود را مشاهده می‌کند. عضو دیگری به جای بیمار زندگی او را روی صحنه بازآفرینی می‌کند در حالی که بیمار با ایجاد فاصله هیجانی در حال مشاهده حوادث است. این تکنیک چه نام دارد؟

(د) tele

(ج) role reversal

(ب) mirror

(الف) double

۳۱- قرار است روانپزشکی سلامت روانی کادر بیمارستانی را بررسی کند. براساس ملاکهای جاهودا همه موارد زیر را باید در نظر بگیرد به جز:

(ب) تجارب درونی مثبت

(الف) هدف داشتن در زندگی

(د) رهایی از فشارهای اجتماعی

(ج) تفوق بر محیط

۳۲- درمانگر به نگین می‌گوید: "متوجه شدی در گروه اغلب ترجیح می‌دهی روبروی عاطفه بنشینی؟! چون عاطفه عین مادرت حرفهای تو را تأیید کرده و به تو اعتماد به نفس می‌دهد تا حرفت را بزنی؟" وی از کدام عامل درمانی در گروه استفاده می‌کند؟

(ب) corrective familial experience

(الف) inspiration

(د) interpretation

(ج) consensual validation

۳۳- مادر کودکی، اخیراً با حس استقلال طلبی کودکش به صورت نه گفتن به درخواست‌های وی و تمایل به انجام کارها به تنهایی و رفتار خشونت‌آمیز به صورت پرت کردن اسباب‌بازی‌هایش روبروست، به نظر شما کودک در چه مرحله از رشد روانی - جنسی قرار دارد؟

- الف) کودک در حال گذراندن رشد طبیعی روانی - جنسی در مرحله آنان است.
ب) کودک در مرحله رشدی دهانی - دیگرآزارانه است.
ج) علائم ناسازگارانه وی حاکی از نشانه‌های پاتولوژیک رفتاری در مرحله پیشابراهی است.
د) رفتارهای کودک حاکی از ورود وی به دنیای رقابت با والد هم‌جنس و همانندسازی با والد غیرهم‌جنس است.

۳۴- از دیدگان جان بولبی و همکارانش، کودکانی که در بزرگسالی رفتارهایی به صورت بی‌اعتنایی نسبت به روابط ابژه (افراد مهم زندگی) دارند و حالتی از خودباوری کاذب یا ضدوابستگی ابراز می‌کنند در کدام گروه از اختلالات دلبستگی ناایمن قرار داشته‌اند؟

- الف) Avoidant or Dismissive
ب) Anxious - ambivalence
ج) Resistance
د) Disorganized - disoriented

۳۵- بیماری بعد از چند جلسه رواندرمانی و برقراری پیونددرمانی، در پایان یکی از جلسات درمان، به ستایش و تحسین درمانگر خود پرداخته و توانایی‌هایی را به او نسبت می‌دهد که اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، تحلیل شما از وضعیت فوق چیست؟

- الف) ادامه وضعیت فوق می‌تواند به ترانسفرانس عاشقانه منجر شود و ضروری است درمانگر عوض شود.
ب) این حالت از موارد ترانسفرانس مثبت است و در صورتی که مقاوم و تکرارشونده باشد نیاز به تفسیر دارد.
ج) اگر با عدم پاسخدهی درمانگر روبرو شود، در بیمار ترانسفرانس منفی ایجاد می‌شود.
د) از مصادیق نورو انتقال است که بایستی بلافاصله تفسیر شود.

۳۶- در جلسه آنالیز، درمانگر به مراجع پیشنهاد می‌کند که می‌تواند خارج از جلسات درمانی نیز به او کمک نماید و وی هر وقت که بخواهد می‌تواند به او تلفن بزند و یا بدون هماهنگی قبلی ویزیت شود؛ این رفتار درمانگر چگونه تبیین می‌شود؟

- الف) برای برقراری پیونددرمانی، در دسترس بودن درمانگر الزامی است.
ب) روش درمانگر به ایجاد سریعتر نورو انتقال کمک می‌کند.
ج) این امر از نشانه‌های کلاسیک و هشداردهنده انتقال متقابل است.
د) رفتار درمانگر ضرورت فوری ختم درمان را موجب می‌شود.

۳۷- در بکارگیری تکنیک‌ها و در مقایسه دو رویکرد رواندرمانی حمایتی با رواندرمانی بیانی کدام عبارت صحیح است؟

- الف) از تداعی آزاد به طور محدود در هر دو رویکرد استفاده می‌شود.
ب) تفسیر ژنتیکی در رواندرمانی حمایتی ممنوع و در رواندرمانی بیانی به صورت محدود کاربرد دارد.
ج) استفاده از داروهای سایکوتروپ به همراه رواندرمانی بیانی به مراتب بیش از حمایتی است.
د) کاربرد تکنیک‌های مراجعه‌سازی و روشن‌سازی در نوع حمایتی بارزتر از نوع بیانی است.

۳۸- در رویکرد سایکودینامیک در ارزیابی بیمار مبتلا به GAD، احتمال ارتباط اضطراب بیمار با فانتزی‌های کدامیک از حوزه‌های زیر کمتر است؟

- الف) ترس‌های بیمار از جدایی افراد مورد علاقه‌اش
ب) ترس‌های بیمار درباره فقدان (loss)
ج) ترس‌های بیمار از اختگی (castration)
د) ترس‌های بیمار از تکانه‌های دگرجنس‌خواهانه

۳۹- دختر ۲۵ ساله‌ای به دنبال از دست دادن رابطه عاطفی تمام روز خود را در تختخواب می‌ماند. مکانیسم دفاعی وی چیست؟

الف) regression (ب) denial (ج) isolation (د) repression

۴۰- دسته‌ای از دفاع‌ها در افراد سالم نیز در کنار بیماری‌های نوروتیک دیده می‌شود و حتی می‌توانند کارکردهای انطباقی و پذیرش اجتماعی داشته باشند. کدام یک از دفاع‌های زیر جز این دسته قرار نمی‌گیرد؟

الف) displacement (ب) sexualization (ج) somatization (د) dissociation

۴۱- کدام دسته از بیماران افسرده پاسخ مناسب به داروهای ضدافسردگی متداول نمی‌دهند؟

الف) افراد افسرده ای که سطح سرمی ویتامین D و کلسیم پایین دارند

ب) افراد افسرده ای که سطح سرمی بالای پتاسیم دارند

ج) افراد افسرده ای که سطح سرمی پایین فولات B12 دارند

د) افراد افسرده ای که سطح سرمی پایین سیستئین سرم را دارند

۴۲- در مورد **Ataque de nervios** کدام عبارت صحیح نیست؟

الف) فاکتور Stressful در شروع آن نقش ندارد

ب) به صورت علائم اضطرابی، خلقی و تجزیه ای و سوماتوform

ج) در فرهنگ امریکای لاتین به صورت بومی مشاهده می‌شود

د) در علائم آن فریاد زدن، گریه کردن و سعی برای آسیب به خود وجود دارد

۴۳- دژنراسیون کدام یک از مسیرهای زیر باعث ایجاد بیماری پارکینسون می‌گردد؟

الف) meso cortical limbic pathway (ب) tuber hypophyseal pathway

ج) meso accumbens dopamine pathway (د) nigro striatal pathway

۴۴- عملکرد هسته‌های قاعده ای نهایتاً از طریق کدامیک از قسمتهای روی کورتکس حرکتی اولیه تاثیر می‌گذارد؟

الف) caudate nucleus (ب) globus pallidus (ج) substantia nigra (د) potamen

۴۵- **neural net profile** یا نیمرخ شبکه عصبی چیست؟

الف) به فعالیتی که در تولید فعالیتهایی به غیر از محرکهای خارجی دخیل می‌باشد

ب) فرایندی که در مسایل روانی دخیل نیست

ج) به الگوی فعالیتی مدارهای عصبی لایه های مختلط مغز گویند

د) فعالیتهای درون سلولهای عصبی که غیر مرتبط با رفتارند

۴۶- در مورد دگرکشی **Homicide** کدام عبارت صحیح است؟

الف) آمار دگرکشی در طبقات بالایی اقتصادی تفاوتی با طبقات پایین اقتصادی ندارد

ب) تفاوت دگرکشی در زنان و مردان بدون در نظر گرفتن اجتماع (جامعه) است

ج) نظریه دگرکشی در تناقض با تئوری اجتماعی- روانشناختی است

د) آمار دگر کشی برخلاف خودکشی در جوامع مختلف تقریباً یکسان می‌باشد

۴۷- در مدل‌های طولی longitudinal کدام عبارت صحیح است؟

- الف) نقاط T time در طی شرایط متفاوت است
ب) شایعترین نگرش و بررسی به آنالیز اطلاعات طول بر اساس مدل اندازه‌های تکراری است
ج) کوواریانس در نقطه پایین تفاوت ندارد
د) یافته‌ها به روشی سه گوشه rectangular جمع‌آوری می‌شود

۴۸- در درمان اختلالات شخصیت کدام مورد صحیح است؟

- الف) در مرحله اول مدیریت بحران و بیان و مشخص شدن جزئیات مشکلات و استرسورها به طریقی است که همراه بیمار در درمان جلب شود.
ب) در مرحله دوم درمان ارزیابی مشخص در مراحل زندگی خویش است
ج) در مرحله سوم درمان آگاهی خویش از رفتارهای نامناسب است
د) در مرحله چهارم جمع‌بندی نظرات دیگران و خود فرد است

۴۹- کدام یک از موارد زیر چندان به نفع وجود یک ضایعه ارگانیک در بیمار با تظاهرات روانپزشکی نمی‌باشد؟

- الف) سیرنوسانی و شروع حاد در یک زن ۳۰ ساله
ب) توهمات لمسی و توأم با هذیاهای Rizarre در یک مرد ۲۰ ساله
ج) اختلال حافظه و علائم حیاتی غیر عادی در یک زن میانسال
د) توهمات بینایی یا بویایی در یک مرد میانسال

۵۰- در درمان بیقراری در اورژانس کدام مورد صحیح است؟

- الف) هدف ایجاد احساس کنترل برای بیمار است تا در درمان بتواند شرکت کند
ب) هدف آرام کردن بیمار با خواب آلودگی است که بتوان ارزیابی صحیح نمود
ج) هرگز از داروهای خوراکی در خط اول درمان استفاده نمی‌کنیم
د) در مواردی که علت بیقراری مشخص نیست نمی‌توان از لورازپام تزریقی استفاده نمود

۵۱- laconic speech با کدام اختلال تکلم یکی است؟

- الف) poverty of speech ب) pressured speech ج) speech block د) loosening of association

۵۲- کدامیک از اصطلاحات زیر برای کسانی که به کار می‌رود که بصورت بیمارگونه از پرواز می‌ترسند؟

- الف) Acrophobia ب) Amaxophobia ج) Apiphobia د) Aviophobia

۵۳- در بیمار مبتلا به آلزایمر که تحت درمان با ۱۰ میلی‌گرم دنپزیل است، به دلیل عوارض گوارشی ناشی از کلینرژیک‌ها

که برای بیمار قابل تحمل نیست، درمانگر تصمیم به تغییر دارو گرفته است، چه دارویی و با چه دوزی شروع شود؟

- الف) گالانتامین با دوز ۸ میلی‌گرم دوبار در روز ب) ریواستگمین با دوز ۳ میلی‌گرم، دوبار در روز
ج) ممانتین با دوز ۵ میلی‌گرم د) ویتامین E با دوز هزار واحد دوبار در روز

۵۴- خانم ۳۰ ساله ای برای اولین بار در پاییز سال گذشته دچار نوعی از خلق افسرده شده بود که به دنبال رویدادهای

مثبت زندگی احساس تغییر یافته او به حالت معمول بر می‌گشت. همراه با آن افزایش وزن و احساس سنگینی در

اندام نیز وجود داشت. دوباره در پاییز امسال علائم وی بدون هیچ استور خاصی عود کرد. این مجموعه علائم با

کدام یک از موارد زیر منطبق است؟

- الف) ملانکولیا ب) آتیپیک ج) فصلی د) غیر اختصاصی

۵۵- بیماری با علائم مانیا بدون تظاهرات سایکوتیک مراجعه کرده است. در طول اپی‌زود اخیر افزایش بیش از حد فعالیت و اختلال قضاوت داشته ولی تا حدودی توانایی مراقبت از خود جهت جلوگیری از آسیب به خود و دیگران را داشته است. در ۴ سال گذشته ۱۲ اپی‌زود مانیا و یک اپی‌زود افسردگی داشته است. در ۱۲ اپی‌زود اول بهبودی و بازگشت کامل به عملکرد را داشته ولی از اپی‌زود قبلی تاکنون علائم باقی مانده و اختلال عملکرد وجود داشته است. کدامیک

از موارد زیر به عنوان **specifier** مطرح می‌کنید؟

الف) severe, without full interepisode recovery

ب) moderate, with full interepisode recovery

ج) severe, with full interepisode recovery

د) moderate without full interepisode recovery

۵۶- خانم مبتلا به اختلال دوقطبی، ۳۲ ساله، مجرد، با تحصیلات دانشگاهی و درآمد بالا و سابقه **Sexual abuse** در کودکی به دلیل داشتن افکار خودکشی به بیمارستان ارجاع شده است. کدامیک از ویژگیهای بیمار می‌تواند ریسک فاکتور برای **completed suicide** محسوب گردد؟

الف) جنسیت زن

ب) مجرد بیمار

ج) داشتن تحصیلات دانشگاهی و درآمد بالا

د) سابقه sexual abuse

۵۷- آقای ۲۶ ساله مبتلا به اسکیزوفرنی و سوءمصرف مواد مخدر که بی‌خانمان بود به پناهگاه بیماران روانی منتقل شده و نیازهای اولیه اش برطرف شد. به نظر شما کدامیک از مراحل بازتوانی درباره بیمار اجرا شده است؟

الف) Comprehensiveness

ب) Motivational Intervention

ج) Assertive Outreach

د) Counseling

۵۸- در درمان فردی که دچار اسکیزوفرنی است و شواهدی دال بر بالا بودن سطح چربی خون در او وجود ندارد، هر چند وقت یکبار باید سطح چربیهای خون او را سنجید؟

الف) هر شش ماه یک بار

ب) هر سال یک بار

ج) هر ۵ سال یک بار

د) لازم نیست

۵۹- کدام یک از موارد زیر در مطالعات **aversive conditioning** پاولوفی به عنوان روش اندازه‌گیری سایکوفیزیولوژیک سنتی محسوب می‌شود؟

الف) skin conductance response

ب) spontaneous fluctuations

ج) skin conductance level

د) tonic heart rate variability

۶۰- اثرات تخریبی **cannabinoids** بر روی حافظه و سیستم ایمنی نتیجه اثر آنها بر روی کدامیک از قسمتهای مغز می‌باشد؟

الف) تخریب حافظه درازمدت از طریق باند شدن روی رسپتورهای نوع ۲ آن CB2 (در کورتکس)

ب) تاثیر روی گیرنده های CB1 در واکنش های التهابی سیستم ایمنی

ج) اثرات تخریبی روی حافظه کوتاه مدت از طریق باند شدن با رسپتور نوع ۱ CB1 روی هیپوکامپوس

د) تاثیر روی سیر mamillary body fornix از طریق رسپتور نوع ۲ CB2

۶۱- در اختلال خشم انتخابی IED کدام نواحی مغزی غالباً درگیر می‌باشند؟
الف) لوب parietal (ب) کورتکس prefrontal
ج) nigrostratial (د) limbic system

۶۲- در درمان خشونت کدام مورد صحیح است؟
الف) درمان ضدسایکوز غالباً تجویز می‌شود و سریع اثر می‌کند
ب) فلووکسامین در افراد با تشخیص مرزی موثر می‌باشد
ج) لیتیوم همراه با فلووکستین در کاهش حملات خشم انفجاری به کار می‌رود
د) داروهای ضدسایکوز جدید با -دوزاژ پایین که مستقل از اثر ضدسایکوز و آرامبخشی آن باشد- اثر دارد

۶۳- برای فرد ۷۰ساله ای با علائم دمانس EEG انجام می‌شود. در کدام یک از موارد زیر انتظار داریم که این ارزیابی طبیعی باشد؟

الف) وقتی علائم به صورت تدریجی با فراموشکاری و اختلال در برنامه ریزی در اداره امور زندگی شروع شده باشد
ب) هنگامی که تغییرات شخصیتی و فراموشکاری در شروع بیماری برجسته باشد
ج) در موردی که توهم بینایی با علائم پارکینسونی برجسته باشد
د) وقتی عیب شناختی به صورت دوره ای همراه با دوره های بدون علامت وجود داشته باشد

۶۴- زن ۴۰ساله ای مبتلا به اختلال تشنجی همراه با دوره هایی از علائم روانپریشی است. تشدید هر یک از این دو علامت در بیمار منجر به کاهش در حیطة دیگر می‌شود. به کار بردن کدام اصطلاح زیر را برای این بیمار مناسب نمی‌دانید؟

الف) Alternating psychosis (ب) Normalization paradoxical
ج) Forced normalization (د) Interictal psychotic disorder of epilepsy

۶۵- کدام یک از موارد زیر درباره شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به CVA صحیح است؟
الف) در حدود ۲۴٪ این بیماران از افسردگی خفیفتر رنج می‌برند
ب) در حدود ۱۴٪ این بیماران به افسردگی شدید مبتلا می‌شوند
ج) در حدود ۳۰٪ این بیماران به افسردگی شدید مبتلا می‌شوند
د) در حدود ۵۰٪ این بیماران به افسردگی خفیف مبتلا می‌شوند

۶۶- کدام یک از تومورهای اولیه مغزی ذیل فراوانی کمتری دارند؟
الف) مننژیوما (ب) گلیوبلاستوما
ج) آستروسیتوما (د) مدولوبلاستوما

۶۷- در کدام یک از آنتی سایکوتیک های زیر عارضه جانبی تشنج شیوع کمتری دارد؟
الف) کلوزاپین (ب) کلروپرومازین
ج) هالوپریدول (د) تیوتکسین

۶۸- کدام یک از موارد زیر جزء اختلالات خودن نوع NOS است؟
الف) جویدن و تف کردن مکرر میزان زیادی غذا در حین بلعیدن
ب) زن مبتلا به آنورکسیا نروزا همراه با قاعدگی منظم
ج) وجود معیارهای آنورکسیا نروزا همراه با کاهش شدید وزن به کمتر از حد نرمال
د) وجود معیارهای بولیمیا نروزا در غیاب پرخوری یا رفتار جبرانی نامناسب با فرکانس حداقل دوبار در هفته

۶۹- کدام عبارت در مورد Anorexia nervosa صحیح نیست؟

الف) سطوح پایین Leptin

ب) افزایش Ghrelin

ج) افزایش Glucagon-like peptide (G-LP-1)

د) سطوح بالای انسولین

۷۰- کدام یک از موارد زیر در الکتروانسفالوگرافی بیماران مبتلا به اختلال خواب ناشی از افسردگی شدید دیده نمی‌شود؟

الف) افزایش کلی میزان امواج بتا در طول دوره خواب شبانه

ب) کاهش امواج آهسته در اولین دوره NREM

ج) افزایش میزان خواب REM در اوایل شب

د) کاهش امواج دلتا در دوره های اولیه خواب REM

۷۱- کدام یک از موارد زیر جزو عواقب "بیخوابی دوران کودکی" در دوران نوجوانی نمی‌باشد؟

الف) limit-setting sleep disorder

ب) insufficient sleep syndrome

ج) irregular sleep-wake pattern

د) inadequate sleep hygiene

۷۲- کدام یک از مقیاس های زیر از اعتبار و روایی خوب تا عالی در مقایسه با سایر مقیاسهای مشابه در ارزیابی اختلالات تجزیه ای برخوردار است؟

الف) dissociative experiences scale (DES)

ب) peritraumatic dissociative experiences questionnaire (PDEQ)

ج) multiscale dissociative inventory (MDI)

د) multidimensional inventory of dissociation (MID)

۷۳- کلیه موارد زیر ظنّ به وجود بیماری جعلی را تقویت می‌کند؟

الف) توانایی پیش بینی سیر غیرعادی علائم یا واکنش به درمان

ب) پیدایش علائم غیرعادی جدید متعاقب رفع علائم قبلی

ج) ملاقات کنندگان متعدد و بیمار احوال

د) آلرژی های دارویی گوناگون

۷۴- زن ۲۶ ساله ای به خاطر نوسان شدید فشار خون، طپش قلب و لرزش اندامها که هر چند روز یکبار جملگی به طور حمله ای عارض شده و پس از حدود ۱-۲ ساعت مرتفع می‌گردند، به اورژانس مراجعه نموده است. در معاینه اولیه بجز افزایش اپی نفرین ادرار و مشاهده جای تزریق بر روی ساعد نکته دیگری یافت نگردید. کدام تشخیص محتملتر است؟

الف) pheochromocytoma

ب) panic attack

ج) sipple's syndrome

د) factitious disorder

۷۵- زن ۳۲ ساله ای با شکایت از درد مفاصل، خستگی و ناتوانی از انجام تکالیف روزانه به کلینیک مراجعه نموده است. در معاینه راشی بر روی گونه ها و بینی بیمار مشاهده می‌شود که به گفته همراه وی پس از دوش آب گرم کمرنگ می‌شود. در آزمایشات پاراکلینیکی نیز ANA, LE cell منفی است. کدام تشخیص محتملتر است؟

الف) SLE

ب) factitious disorder

ج) AIDS

د) excoriations

۷۶- در افرادی که با علائم **endocrine** و با احتمال تشخیص **factitious disorder** مراجعه می‌نماید کدام یک از موارد زیر جزء تشخیص افتراقی محسوب نمی‌شود؟

- (الف) سندرم کوشینگ
(ب) سندرم های مربوط به اختلال در هورمون رشد
(ج) هیپوگلیسمی
(د) هیپرتیروئیدی

۷۷- کدام یک از دلایل زیر باعث شده است در **DSM-IV-TR**، **trichotilomani** را از **OCD** جدا طبقه بندی کنند؟

- (الف) تفاوت پاسخ به SSRI
(ب) تفاوت پاسخ به lithium
(ج) تفاوت پاسخ به داروهای ضد تشنج
(د) تفاوت پاسخ به داروهای آنتی سایکوتیک نسل اول

۷۸- در مطالعات نورویبولوژیک اختلال چند شخصیتی توسط **F- MRI** همه موارد صحیح است به جز:

- (الف) هیپوآکتیویته نواحی دورسولاترال
(ب) تغییرات دو طرفه در هیپوتالاموس
(ج) تغییرات دو طرفه در نواحی تمپورال میانی
(د) هیپوآکتیویته نواحی اوربیتوفرونتال

۷۹- کدام یک از علائم زیر در **Dissociative Identity disorder** دیده نمی‌شود؟

- (الف) علائم سایکوتیک
(ب) علائم سوماتوفرم
(ج) علائم خلقی
(د) علائم وسواسی

۸۰- کدام عبارت در مورد **Enuresis** شبانه صحیح نیست؟

- (الف) معمولاً بعد از آموزش برای توالت رفتن قبل از ۶ سالگی رفع می‌شود
(ب) سابقه **enuresis** در والدین این عارضه را تشدید می‌کند
(ج) یک ژن **dominant** منفرد به نظر می‌رسد مسؤول است
(د) شب ادراری ثانویه همراه با تشنج شبانه نمی‌باشد

۸۱- کدام گزینه شامل شایعترین پارافیلیاها است؟

- (الف) **pedophilia, vuyerism, exhibitionism**
(ب) **masochism, sadism, pedophilia**
(ج) **pedophilia, transvestism, vuyerism**
(د) **pedophilia, transvestism, sadism**

۸۲- در درمان همجنس گرایان:

- (الف) ارینتاسیون جنسی روانپزشک در پیش آگهی درمان فاکتور مهمی نیست
(ب) زمان مناسبی برای تبادل اطلاعات جنسی درمانگر و بیمار است
(ج) درمانگر همجنس گرا باشد بهتر است تا به برقراری راپورت کمک شود
(د) تعیین موثر بودن درمان، همدلی درمانگر با بیمار مهمترین عامل است

۸۳- در درمان انزال زودرس:

- (الف) درمان انتخابی از SSRIs به طور مقطعی است و نیاز به تجویز روزانه نمی‌باشد
(ب) همراهی SSRIs و sildenafil توصیه می‌گردد
(ج) زایلوکائین موجب انزال زودرس می‌شود و بیحشی موضعی و تسریع erection می‌گردد
(د) کلومی پرامین موجب تاخیر سریع (۱-۵/ساعت) پس از استفاده می‌گردد

۸۴- آقای ۳۱ ساله دانشجوی دکترای فیزیک که یک سال قبل ازدواج کرده به علت مشکلات مالی در منزل پدری زندگی می‌کند، با شکایت از انزال زودرس مراجعه کرده است. ذکر می‌کند در سالهای اول جوانی روابط جنسی متعدد با افراد مختلف را تجربه کرده ولی پس از آن سالها رابطه جنسی نداشته است. کدام یک از موارد زیر در رابطه با شکایت وی بیشترین نقش را دارد؟

- الف) biological vulnerability
ب) long term abstinence
ج) cultural conditioning
د) high level of education

۸۵- آقای ۲۱ ساله با سابقه سوءمصرف الکل و اعتیاد به تریاک و سیگار، به دنبال تمایل شدید برای زندگی به عنوان جنس مخالف به روانپزشک مراجعه کرده است. روانپزشک پس از گذاردن تشخیص اختلال هویت جنسی و عدم پاسخ به رواندرمانی و زندگی به عنوان جنس مخالف درمان هورمونی را برای وی توصیه کرده است. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

- الف) قطع سیگار و شروع هورمون درمانی و تزریق هر ۲ هفته یکبار استروژن
ب) قطع مصرف الکل قبل از آغاز هورمون درمانی
ج) قبل از زندگی در نقش جنس مخالف باید هورمون درمانی آغاز شود
د) قطع سیگار و مصرف روزانه قرص های استروژن

۸۶- کدام یک از موارد زیر درباره شیوع بیماریهای روانی در سالمندان صحیح است؟

- الف) به جز دمانس در سالمندان مانند جوانان است
ب) به جز دمانس در سالمندان کمتر از جوانان است
ج) به جز دمانس در سالمندان بیشتر جوانان است
د) حتی با وجود دمانس در سالمندان کمتر جوانان است

۸۷- کدام یک از موارد مصرف توصیه شده پرومتازین نمی‌باشد؟

- الف) درمان کمکی داروهای ضد درد
ب) درمان استفراغ
ج) درمان کمکی در جراحی
د) سندرم سروتونین

۸۸- بیماری به علت ابتلا به تشنج تحت درمان است، اما تشنج او کنترل نشده است و شما می‌خواهید داروهای دیگری اضافه کنید. همسر بیمار از دندان قروچه شبانه بیمار شاکی است. مطالعات اولیه تاثیر کدام دارو را در رفع این مشکل تایید می‌کند؟

- الف) لوتیراستام
ب) پره گابالین
ج) تیاگابین
د) توپیرامات

۸۹- بیمار با شکایت از اینکه از هیچ چیز لذت نمی‌برد، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، کاهش تمرکز، و اشتغال فکری با مرگ از یک ماه قبل، مراجعه کرده است. در معاینه کامل از بیمار به جز تاخیر هدایتی قلب **Conduction delay** مشکل دیگری به دست نمی‌آید. در تاریخچه خانواده احتمال بیماری دوقطبی در یک نفر از خاله‌ها مطرح شده است. کدام یک از داروهای زیر در درمان او چه حال و چه آینده مطلقاً نقشی ندارد؟

- الف) نورتریپتیلین
ب) فلوکستین
ج) کلونازپام
د) لیتیموم

۹۰- فرد مذکری به دنبال مصرف داروهای آنتی سایکوتیک متعارف دچار علائم احتمالی سندرم نورولپتیک بدخیم شده است. در صورت ابتلا نامبرده به (NMS) کدامیک از علائم کمتر احتمال دارد مربوط به سندرم فوق باشد؟

- الف) افزایش راتنین فسفوکیناز CPK
ب) افزایش ترانس آمینازهای کبدی
ج) لکوپنی
د) رژییدیته شدید عضلات و تاکی کاردی

۹۱- کدامیک از تاثیرات فارماکولوژیک بوپروپیون مانع از کاهش میل جنسی می‌گردد؟

- (الف) اثر بوپروپیون در کارکرد نورآدرنژیک
(ب) عدم تاثیر بر سیستم سروتونرژیک
(ج) اثرات مهاری بازجذب دوپامین در بوپروپیون
(د) اثرات شبه آمفتامینی بوپروپیون

۹۲- خانم ۲۱ساله ای به علت احساس نشاط بیش از حد همراه با ولخرجی و افزایش تمایلات مذهبی توسط خانواده خود به درمانگاه روانپزشکی ارجاع شده است. دستیار روانپزشکی اصرار دارد تا دارویی برای بیمار تجویز شود که توسط اداره دارو و غذای امریکا مورد تایید قرار گرفته است. کدام دارو تجویز نمی‌شود؟

- (الف) آریپیپرازول (ب) زیپرازیدون (ج) آسناپین (د) الانزاپین

۹۳- کدام یک از داروهای ضد تشنجی زیر می‌تواند باعث کاهش وزن گردد؟

- (الف) gabapentin (ب) Pregabalin (ج) Topiramate (د) Zonisamide

۹۴- کدام یک از عبارات زیر در مورد درمان NMS صحیح نمی‌باشد؟

- (الف) Levodopa ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم در روز
(ب) Bromocriptine تا حداکثر روزی ۴۵ میلی‌گرم
(ج) ECT حتی به تعداد ۳ جلسه
(د) Dantrolene 1mg/kg/day به مدت ۸ روز تزریقی

۹۵- پسر ۱۱ساله مبتلا به صرع که تحت درمان با داروهای ضدصرع می‌باشد دچار کاهش رشد شده است. کدام یک از داروهای زیر بیش از بقیه می‌تواند مسبب این اختلال در بیمار شده باشد؟

- (الف) topiramate (ب) pregabalin (ج) gabapentin (د) levetiracetam

۹۶- برای آقای ۳۰ساله مبتلا به اختلال دو قطبی oxacarbazepine تجویز می‌کنید. کدام یک از موارد زیر در مورد تجویز دارو صحیح است؟

- (الف) CBC diff هفتگی در ابتدای درمان برای بررسی ساپرسیون خوش خیم گلبولهای سفید
(ب) CBC diff ماهانه در ابتدای درمان برای بررسی ساپرسیون کلیه المانهای خونی
(ج) ارزیابی خونی در زمان مصرف این دارو لازم نیست
(د) توصیه به بیمار که اگر دچار تب، گلودرد یا خونریزی شدید شد دارو را قطع و مراجعه نماید

۹۷- آقای ۳۵ساله به علت OCD تحت درمان فلوکستین ۶۰میلیگرم روزانه است. بعد از مصرف دارو از تعریق زیاد که مانع کار اوست شکایت دارد، کدام یک از داروهای زیر بهتر کمک کننده است؟

- (الف) نورتریپتیلین (ب) اکس بوتینین (ج) ونلافاکسین (د) ایمی پرامین

۹۸- بیمار ۴۵ساله اسکیزوفرنیک تحت درمان روزانه ۲۵میلی گرم آریپیپرازول بوده و علائم در کنترل نسبی است به دنبال ناراحتی کبدی بیمار دچار اختلال در کارکرد کبد شده است، دوز دارو چگونه تغییر می‌یابد؟

- (الف) عدم تغییر دوز (ب) کاهش دوز دارو (ج) افزایش دوز دارو (د) قطع دارو و جایگزین نمودن دارو

۹۹- خانم ۴۵ساله ای مبتلا به سندرم پاهای بیقرار می‌باشد. پزشک وی قصد دارد پیش از تجویز روپیرینول، وی را از عوارض آن مطلع کند. به نظر شما کدامیک از موارد زیر را مطرح نمی‌کند؟

- (الف) احتمال به خواب رفتن ناگهانی حین فعالیتهای روزمره (ب) احتمال ایجاد هذیانهای گزند و آسیب
(ج) احتمال ایجاد توهم (د) احتمال افت فشار خون وضعیتی

۱۰۰- خانم ۳۵ ساله ای با تشخیص اختلال دوقطبی تحت درمان لیتیوم قرار می‌گیرد، بعد از یک ماه از مصرف دارو در آزمایشات پاراکلینیکی TSH خون کمی بالا می‌رود اما علائم کلینیکی هیپوتیروئیدی را ندارد. در برخورد با این بیمار از کدامیک از روشهای زیر استفاده می‌کنید؟

ب) از لووتیروکسین استفاده می‌کنیم

الف) تغییر در میزان لیتیوم مصرفی نمی‌دهیم

د) از نمک یددار استفاده می‌کنیم

ج) از تریودوتیرونین استفاده می‌کنیم

پاسخنامه امتحان کتبی دستیاران - اردیبهشت ماه ۹۳

سوال	الف	ب	ج	د
۵۱				
۵۲				
۵۳				
۵۴				
۵۵				
۵۶				
۵۷				
۵۸				
۵۹				
۶۰				
۶۱				
۶۲				
۶۳				
۶۴				
۶۵				
۶۶				
۶۷				
۶۸				
۶۹				
۷۰				
۷۱				
۷۲				
۷۳				
۷۴				
۷۵				
۷۶				
۷۷				
۷۸				
۷۹				
۸۰				
۸۱				
۸۲				
۸۳				
۸۴				
۸۵				
۸۶				
۸۷				
۸۸				
۸۹				
۹۰				
۹۱				
۹۲				
۹۳				
۹۴				
۹۵				
۹۶				
۹۷				

سوال	الف	ب	ج	د
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				

نام و نام خانوادگی:

.....

- با امید به موفقیت تمامی شما عزیزان،
 لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:
۱. پاسخها حتماً به صورت (X ضربدر) و داخل کادر باشد.
 ۲. پاسخها با خودکار آبی یا مشکی مشخص شود.
 ۳. در صورت مشاهده بیشتر از یک پاسخ برای یک سوال، نمره‌ای به سوال مورد نظر تعلق نخواهد گرفت.

نمره کل:

.....

تأیید مسؤؤل آموزش دستیاری

تأیید مسؤؤل گ...

				၄၈
				၄၉
				၅၀

				၄၈
				၄၉
				၅၀