

به نام خدا



دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

آزمون کتبی دستیاران روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

اردیبهشت ۱۳۹۶

۱. در مورد هیپوکندریازیس کدام عبارت صحیح است؟

- (الف) در دانشجویان پزشکی به طور گذرا یافت می شود
(ب) بیماران این گروه تحمل و آستانه زیادی به ناراحتی ها و مشکلات جسمانی دارند
(ج) میتواند مقدمه و ابتدای بیماری دیگر حاد روانی مثل افسردگی اساسی باشد
(د) در سیر بیماری اعتقاد بیمار به دارا بودن مشکل جسمی عمدتاً ثابت بوده و به بیماری دیگری تغییر نمی یابد.

۲. در اختلال علایم کارکردی نرولوژیکال (عصبی) یا اختلال تبدیلی کدام مورد صحیح است؟

- (الف) در همراهی با اسکیزوفرنی شایع می باشد
(ب) شایع ترین اختلالات شخصیت همراه با بیماری اختلال شخصیت مرزی است
(ج) طبق تعریف تئوری یادگیری شرطی شده علایم بیماری به نوعی مدارا و قبول وضعیت ها و شرایط غیر قابل قبول می باشد
(د) در واکنش های سوگ بیمار گونه فرد داغدار بیمار کاهش علایم را دارد.

۳. دانشجوی ۲۳ ساله ای با شکایات گوارشی از بی اشتها و تهوع از سرویس داخلی گوارش برای مشاوره روانپزشکی مراجعه نموده است. در معاینه بیمار از انجام امتحانات و ترس از عدم موفقیت در آنها بسیار مضطرب بود. وی در اواخر ترم از علایم اضطرابی با تنگی نفس و دل به هم خوردگی شاکی بود. سابقه بی خوابی را از چند ماه قبل ذکر می کند. بیماری روانپزشکی و مصرف مواد در خودش و خانواده اش منفی می باشد. کدام عبارت در موارد زیر صحیح است؟

- (الف) عوامل روان شناختی عمدتاً در آغاز گوارشی وی نقش عمده ای نداشته است
(ب) برای کاهش اضطراب اجرایی تجویز سیتالوپرام روزانه ۲۰ میلی انجام شود
(ج) روش آرام سازی به تنهایی بر مسایل و مشکلات گوارشی تاثیر فراوان دارد
(د) استرس موجب کاهش تون استراحت اسفنکتر فوقانی مری و افزایش دامنه انقباضات در قسمت انتهایی مری می گردد.

۴. برای بیماری که دچار سردرد تنشی است بررسی عوامل بروز تنش در عضلات انجام شده و اقدام به آرام سازی آموزش داده شده است. به نظر شما چه نوع درمانی در مورد ایشان صورت گرفته است؟

- (الف) پس خوراند زیستی (ب) هیپنوتیزم (ج) حساسیت زدایی تدریجی (د) بازسازی شناختی

۵. آقای ۲۰ ساله ای با گزارش تشنج توسط خانواده به اورژانس منتقل شده است. کدام یک از گزینه ها بیشترین کمک را برای تشخیص واقعی بودن تشنج می کند؟

- (الف) بی اختیاری ادراری (ب) فقدان رفلکس گاغ و مردمک
(ج) گزارش وجود اختلال صرعی (د) آسیب دیدگی پس از سقوط

۶. در کدام یک از بیماری های زیر احتمال بروز تغییرات غیر طبیعی در نوار مغزی بیشتر است؟

- (الف) بیماری پارکینسون (ب) صرع آبسانس (ج) کاتاتونی (د) تومورهای عمقی مغز

۷. کدام یک از امواج مغزی به طور طبیعی در نواربرداری یک فرد بزرگسال بیدار ثبت نمی شود؟

- (الف) دلتا (ب) تتا (ج) آلفا (د) بتا

۸. در حضور کدام یک از یافته‌ها یا اختلالات بالینی زیر، شک به وجود یک فاکتور ارگانیک یا طبی برای علایم روانپزشک بیمار کمتر وجود دارد؟

الف) بروز تشنج (ب) علامت فوکال عصبی (ج) کاتاتونی (د) سندرم نورولپتیک بدخیم (NMS)

۹. فرد میانسالی با بی‌قراری شدید و تغییر سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده است؛ به زمان و مکان دیس‌اورینته است. دمای بدن و فشار خون بالاست. بیمار تعریق شدید دارد و لرزش در اندام‌ها مشهود است. منبعی برای اخذ شرح حال دقیق نداریم. از بیمار نوار مغزی به عمل آمده که امواج سریع بیش از اندازه ثبت شده است. کدام تشخیص محتمل است؟

الف) مسمومیت با اپیوئیدها (ب) مصرف کوکائین (ج) ترک الکل (د) مسمومیت با TCA

۱۰. مرد ۵۸ ساله که ۲ ماه قبل دچار استروک شده است با اختلال در نامیدن و خواندن مراجعه کرده است. بیمار سلیس صحبت می‌کند اگر چه گاهی برای پیدا کردن کلمه مناسب مکث می‌کند. خواندن در بیمار به شدت مختل است به طوری که تنها ۴ حرف از ۱۰ مورد را تلفظ کرد اما نوشتن طبیعی است، بیمار نتوانست نام اشیاء را بگوید اما در کپی کردن شکل آنها و دسته‌بندی آنها بر اساس اندازه و شکل مشکلی نداشت. بیمار کدام اختلال زیر را دارد؟

الف) Prosopagnosia (ب) apperceptive visual agnosia (ج) associative visual agnosia (د) wernicke aphasia

۱۱. در ارزیابی شناختی، از بیمار خواسته شد که در میان لیستی که به صورت تصادفی از حروف مختلف الفبا تشکیل شده، هر بار که حرف «م» را می‌شنود، با انگشت ضربه‌ای بر میز بزند. بیمار اشتباهات مکرر دارد و با ادامه آزمون میزان این اشتباهات بیشتر می‌شود. اختلال در عملکرد کدام قسمت مغز وجود دارد؟

الف) فرونتال راست (ب) اکسی پیتال دو طرفه (ج) تالاموس (د) هیپوکامپ چپ

۱۲. آسیب در کدام یک از ساختارهای لیمبیک منجر به اختلال در توانایی در تشخیص ترس و خشم در صدا یا چهره دیگران می‌شود؟

الف) amygdale (ب) septum (ج) fornix (د) basal forebrain

۱۳. خانم ۷۵ ساله‌ای با بروز ناگهانی اختلال بینایی از یک هفته قبل مراجعه کرده است. به طوری که در وارد کردن کلید در قفل دچار مشکل شده است هنگام باز کردن در با صورت به در برخورد می‌کند. در خواندن و نوشتن نیز دچار مشکل شده است. در معاینه کاملاً اورینته بوده و سلیس صحبت می‌کند. تست حدت بینایی اصلاح شده برای هر دو چشم ۹ دهم است، بیمار در معاینه تصاویر دو بعدی را تشخیص می‌دهد، وقتی چند تصویر هم‌زمان ارائه می‌شود در تشخیص آنها دچار اختلال است. بیمار قادر نیست علیرغم دیدن اشیاء روی میز، آنها را با دست بردارد و هر بار محل آنها را اشتباه تخمین می‌زند. حرکات چشم‌ها نیز به طرفین میدان دید کند شده است. از بیمار تصویربرداری مغزی به عمل آمد. محل ضایعه کجاست؟

الف) درگیری دو طرفه پارتیواکسی پیتال (ب) درگیری پری‌تال نیمکره غالب (ج) درگیری لوب سینگوله (د) درگیری پل مغزی (پونز)

۱۴. کدام یک از موارد زیر در مورد اختلالات مرتبط با ساختارهای بازال گانگلیا صحیح است؟

الف) بروز برادی‌کینزی در درگیری هسته caudate (ب) بروز تومور در آسیب هسته subthalamic (ج) بروز tic در درگیری pallidum (د) بروز رژیدیتیه در درگیری substantia nigra

۱۵. کدام یک از داروهای زیر برای درمان اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD) مورد تایید سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) نمی باشد؟

الف) متیل فنیدیت ب) بوپروپیون ج) اتوموکستین د) دکسترو آمتامین

۱۶. در مورد تظاهرات اختلالات روانپزشکی در کودکان کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) اختلالات روانپزشکی در کودکان به جای اینکه به صورت بروز علائم خاصی ظاهر شود، اغلب به صورت عدم پیشرفت تکاملی در یک یا چند حوزه ظهور می یابد

ب) تظاهرات بالینی اختلالات روانپزشکی تحت تاثیر وضعیت و سن تکاملی کودک است

ج) در بسیاری از کودکانی که به کلینیک مراجعه می کنند می توان تمام مشکلات را با یک تشخیص جمع بندی نمود

د) برخی هیجانات و رفتارها می تواند به عنوان بخشی از تکامل طبیعی تلقی شود.

۱۷. کدام یک از موارد زیر در نوجوانان برای خودکشی distal risk factor محسوب می شود؟

الف) داشتن افکار قوی خودکشی ب) سو مصرف حشیش و الکل

ج) عدم برخوردی از حمایت مناسب اطرافیان د) سابقه سو استفاده جنسی در کودکی

۱۸. هشدار FDA در مصرف دسموپرسین در درمان شب ادراری در کودکان، جهت پیشگیری از کدام عارضه می باشد؟

الف) عوارض هدایتی قلب ب) نارسایی کلیوی ج) هیپوناترمی و تشنج د) نارسایی کبدی

۱۹. کودک ۱۰ ساله ای با حرکاتی به صورت پرتاب کردن دستها مراجعه کرده است. جهت افتراق اختلال نوره از اختلالات

حرکتی در این کودک، کدام یک از خصوصیات زیر در شرح حال و معاینه به ضرر تشخیص اختلال توره می باشد؟

الف) داشتن سیر wacing & waning ب) عدم وجود تیکهای حرکتی ساده

ج) شروع در کودکی یا نوجوانی د) وجود تیکهای صوتی

۲۰. در نوجوانی که به علت علائم سایکوتیک تحت درمان با الانزاپین بوده و دچار هیپرپرولاکتینمی شده، تعویض الانزاپین به

کدام یک از داروهای زیر مناسب تر است؟

الف) کونتیاپین ب) کلوزاپین ج) زیپراسیدون د) اریپیرازول

۲۱. سری سوالات CRAFFT در نوجوانان جهت غربالگری کدام اختلال به کار می رود؟

الف) low self esteem ب) substance abuse ج) anxiety disorder د) eating disorder

۲۲. کودک ۸ ساله ای به دلیل مشکلات درسی به درمانگاه ارجاع داده شده است. در بررسی به عمل آمده کودک در spelling

کلمات مشکل دارد. جملات گفتاری و نوشتاری او مملو از اشکالات گرامری است. نمی تواند پاراگرافها را به صورت مرتب به

کار ببرد. وی در زمینه ریاضی مشکل خاصی ندارد. محتمل ترین اختلال برای وی کدام است؟

الف) اختلال written expression ب) اختلال reading ج) اختلال کمبود توجه د) اختلال یادگیری NOS

۲۳. کودک ۱۰ ساله ای از یک سال قبل مکررا رفتار منفی کارانه، خشونت آمیز و گستاخانه دارد و اغلب با بزرگسالان مشاجره

می کند و کینه توز و انتقامجو است و عمدا دیگران را ناراحت می کند. اما قوانین اجتماعی را به صورت جدی زیر پا نمی گذارد.

کدام تشخیص برای وی مطرح است؟

الف) اختلال سلوک ب) اختلال نافرمانی - مقابله جویی ج) اختلال بیش فعالی - کمبود توجه د) اختلال انطباقی

۲۴. کودکی ۸ ساله با قد کوتاه و سابقه تاخیر رشد کلامی و حرکتی، در شناخت رنگ‌ها مشکل دارد و شمارش اعداد را تا ۵ بلد است. وی به دلیل برخورد شدید و اشتغال ذهنی زیاد با خوردن به شما مراجعه کرده است. احتمال وجود کدام یک از سندرم‌های زیر در وی بیشتر است؟

- الف) fragile x syndrome (ب) prader- Willi syndrome
ج) Cri-du-chat syndrome (د) Williams syndrome

۲۵. دختر ۴ ساله‌ای را به دلیل لکنت زبان که از یک سال قبل شروع شده نزد شما آوردند. در مورد پیش آگهی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

- الف) بهبودی خود به خودی در ۸۰ درصد موارد اتفاق می‌افتد (ب) احتمال بهبودی خود به خودی در پسران بیشتر است
ج) بهبودی کامل بعد از بلوغ ایجاد می‌شود (د) الگوی این اختلال در طول زمان ثابت است

۲۶. دختر ۷ ساله‌ای به علت بی اختیاری ادرار که از یک ماه قبل شروع شده است به شما مراجعه کرده است. اولین اقدام شما چیست؟

- الف) بررسی عفونت ادراری (ب) تجویز دسموپرسین (ج) تجویز ایمی پرامین (د) بررسی مالفورماسیون آناتومیک

۲۷. کودک ۲ ساله‌ای با مشکل عدم توانایی حرف زدن توسط والدین خود مراجعه کرده است. او هیچ کلمه‌ای را به کار نمی‌برد و فقط با تولید سر و صدا و اشارات بدنی خواسته‌هایش را ابراز می‌کند. اسامی تعداد کمی از افراد و اشیاء را درک کرده و درک محدودتری نسبت به دستورات کلامی ساده در مقایسه با همسالانش دارد. کودک نسبت به محیط و فعالیت‌های همسالان علاقه نشان می‌دهد و مهارت‌های حرکتی و بازی او متناسب با همسالان می‌باشد. کدام یک از تشخیص‌های زیر برای این کودک مطرح است؟

- الف) autistic disorder (ب) expressive language disorder
ج) mixed receptive- expressive language disorder (د) mental retardation

۲۸. پسری ۱۳ ساله سه ماه قبل حین رفتن به مدرسه طی یک دعوی خیابانی مورد هجوم گروهی از جوانان بزهکار قرار گرفته و با چاقو مجروح شده است. از آن زمان دچار علایم زیر گردیده است: کابوس شبانه، از خواب پریدن‌های مکرر، افکار مزاحم در مورد حادثه، گریه‌های مداوم، ترک تحصیل، اجتناب از صحبت کردن در مورد حادثه، احساس غریبی از دیگران، اشکال در تمرکز. در حال حاضر بیشترین شواهد حاکی از اثربخشی کدام یک از درمان‌های زیر در مورد اختلال وی می‌باشد؟

- الف) CBT (ب) تجویز SSRI (ج) تجویز کلونیدین (د) تجویز بنزودیازپین

۲۹. پسر بچه ۶ ساله‌ای با شکایت پر تحرکی به شما ارجاع داده شده است. در کلینیک بسیار پر تحرک است بدون هدف راه می‌رود، به اطرافیان توجهی ندارد. وی از سال گذشته شروع به تکلم کرده و در حال حاضر فقط چند کلمه می‌گوید، بازی خیالی ندارد، تمایلی به ارتباط با همسالان ندارد. حرکات تکراری در دست‌ها دارد. والدین در سبک سالگی متوجه تفاوت‌های وی با دیگران شدند. کدام تشخیص محتمل‌تر است؟

- الف) ADHD (ب) اختلال رت (ج) اختلال اتیستیک (د) اختلال اسپرگر

۳۰. نوجوان ۱۴ ساله‌ای با علایم حاد اختلال دو قطبی از دو هفته قبل مراجعه کرده است. خانواده بیمار می‌گویند که بیمار از سن ۶ سالگی دارای علایم اختلال نقص توجه / بیش فعلی نیز می‌باشد. کدام رویکرد دارو درمانی برای این بیمار صحیح می‌باشد؟

- الف) فقط داروی تثبیت کننده خلق تجویز می‌شود و نیازی به تجویز ریتالین نمی‌باشد
ب) باید هم زمان داروی تثبیت کننده خلق و ریتالین تجویز شود

ج) بهتر است با داروی تثبیت کننده خلق، وضعیت هیجانی بیمار کنترل و سپس ریتالین تجویز شود
د) تجویز ریتالین به تنهایی برای درمان هر دو اختلال کفایت می کند

۳۱. کدام یک از موارد زیر در مورد داروهای psychostimulant نادرست است؟

- الف) بیش از ۷۰ درصد کودکان مبتلا به ADHD در سنین مدرسه به این دارو پاسخ می دهند
ب) ساختار این داروها شبیه دوپامین و نوراپی نفرین است
ج) potency دکستروآمفتامین از دکس متیل فنیدیت بیشتر است
د) دفع ادراری متابولیت های آمفتامین به دنبال مصرف آب پرتقال کاهش می یابد

۳۲. پسر ۷ ساله ای هنگام رفتن به مدرسه دچار علایمی مانند سردرد، تهوع و درد شکم می شود، برای رفتن به مدرسه مقاومت می کند، به محض دور شدن از والدین نگران آسیب دیدن خود با آنها می شود. درمان انتخابی وی کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) CBT (ب) فلوکستین (ج) ایمی پرامین (د) کلونازپام

۳۳. دختر ۱۳ ساله ای با علایم خلق بالا، پرخاشگری، بزرگ منشی، کاهش نیاز به خواب و پر حرفی که از یک ماه قبل شروع شده و منجر به افت تحصیلی وی شده به شما ارجاع شده است. کدام یک از داروهای زیر در کنترل علایم وی تاثیر کمتری دارد؟

- الف) ریسپریدون (ب) اکس کاربازپین (ج) لیتیم (د) آریپیپرازول

۳۴. کودک ۶ ساله ای با تیک حرکتی به صورت پلک زدن که از ۳ هفته قبل ایجاد شده به شما ارجاع شده است. کدام یک از تشخیص های زیر برای وی مطرح است؟

- الف) tourettes disorder (ب) transient tic disorder
ج) chronic motor tic disorder (د) tic disorder NOS

۳۵. مطابق با یافته های پژوهش چاپ شده در مجله روانپزشکی آمریکا (فوریه ۲۰۱۶؛ ۲: ۱۷۳) شروع درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مقاوم به درمان با کدام یک از داروهای زیر در مقایسه با داروهای روانپزشکی نسل اول تاثیر بیشتری داشته است؟

- الف) کلوزاپین (ب) اولانزاپین (ج) ریسپریدون (د) کوئی تیاپین

۳۶. مراجع خانم ۳۵ ساله، ابتدا برای درمان به بخش فوریت های پزشکی مراجعه کرده است. او گفت وقتی پشت میز کارش نشسته بود به طور ناگهانی دچار تنگی نفس، سرگیجه، تاکی کاردی، رعشه و احساس وحشت از مردن به دلیل حمله قلبی شده است همکارش او را به اورژانس رسانده و بررسی های قلبی و ریوی مشکل عضوی خاصی نشان نداده است. در بررسی روانپزشکی مشخص شد که بیمار در طول ماه گذشته دو دوره مشابه تجربه کرده است و در هر دو مورد علایم نسبتا به سرعت رفع شده است. مراجع نگران بود که حملات دو برابر تکرار شده و پس از یکی از حملات بمیرد. جهت شروع درمان دارویی این بیمار بر اساس FDA و هم چنین تحمل بهتر بیماران کدام گزینه مناسب تر است؟

- الف) فلوکساتین ۵-۲۰ میلیگرم (ب) پروکساتین ۵-۱۰ میلیگرم (ج) سرتالین ۱۲/۵-۲۵ میلیگرم (د) سیتالوپام ۱۰ میلیگرم

۳۷. بیمار با نشانه هایی حاکی از اختلال پانیک مراجعه کرده است. بر اساس مضامین روانپوشی در این اختلال کدام مکانسم دفاعی زیر به طور معمول به کار نمی رود؟

- الف) reaction formation (ب) somatic sation (ج) distortion (د) undoing

۳۸. در کدام یک از اختلالات زیر، نقش میانجی‌های عصبی استیل کولین، دوپامین، گلوتامات، گابا، سروتونین، نوراپی نفرین، ملاتونین مطرح است؟

الف) دلیریوم (ب) دمانس (ج) اسکیزوفرنیا (د) اختلالات اضطرابی

۳۹. بیمار دچار تومور در حالت استراحت، سختی چرخ دنده‌ای عضلات، و راه رفتن به صورت کشیدن پاها روی زمین می‌باشد. از چند روز قبل دچار اختلال هوشیاری، کاهش تمرکز، و حفظ یا تغییر توجه شده است. شناخت بیمار مختل و در طول روز در حال نوسان است. همه گزینه‌های زیر در صورت اقتضا قابل اجرا است به جز؟

الف) کاهش دوز داروی جاری برای بیماری اصلی (ب) استفاده از کلوزاپین
ج) استفاده از کوئیتاپین (د) استفاده از کلرپرومازین

۴۰. بیمار سالمند از حدود چند ماه قبل شوخی‌های نامناسب انجام می‌دهد، با افراد غریبه احساس آشنایی اغراقی دارد، هنجارهای اجتماعی را زیر پا می‌گذارد، اشارات یا رفتارهای جنسی نامناسب دارد، آژیته و تحریک پذیر است، به صورت تکنانشی خرید می‌کند و سریع تحت تاثیر القائات فروشندگان قرار می‌گیرد و پرخاشگری می‌کند و خانواده احساس کرده‌اند از چند هفته قبل فراموشی پیدا کرده است و گاهی کلمات را به اشتباه جای یکدیگر می‌گوید. کدام یک از درمان‌های زیر برای او می‌تواند موثر باشد

الف) دونپزیل (ب) ممانتین (ج) سدیم والپروات (د) متیل فنیدیت

۴۱. بیمار مبتلا به پارکینسون اخیراً به نوعی اختلال خلقی مبتلا شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد صحیح نیست؟
الف) احتمال جنسیت مذکر بیشتر است

ب) احتمال بیشتری دارد پارکینسون طرف چپ را بیشتر مبتلا کرده باشد
ج) وضعیت مذکور ممکن است واکنش روانی به استرس ناشی از ابتلا به یک بیماری شدید باشد
د) کاهش میزان مونوآمین‌ها در این وضعیت نقش دارد.

۴۲. مرد ۷۰ ساله‌ای به علت از یاد بردن نام نوه‌های خود و اختلال گاه به گاه در تمرکز و نیز کندی حرکات که از ۵ سال پیش شروع شده بود و با سیر نوسانی همراه بود، توسط همسر برای ارزیابی به درمانگاه روانپزشکی ارجاع می‌شود. در مصاحبه از آدم‌هایی با قیافه‌های عجیب صحبت می‌کند که در هر هفته چند بار به دیدن او می‌آیند ولی بقیه قادر به دیدن آنها نیستند. لرزش دست‌ها در معاینه جلب توجه می‌کند. کدام یک از یافته‌های زیر در پاتولوژی مغز این بیمار محتمل است؟

الف) پروتئین‌های فسفریله همراه با کلاف‌های نوروفیبریلاری خارج سلولی
ب) پروتئین‌های آمیلوئیدی داخل سلولی همراه با تغییرات ایسکمیک عروق کوچک
ج) اجسام کروی شکل ائوزینوفیلی داخل سیتالوپلاسما
د) اجسام نخی شکل ائوزینوفیلی خارج سیتالوپلاسما

۴۳. خانم ۸۰ ساله‌ای که از ۷ سال پیش به تدریج دچار اختلال در امور اساسی خانه داری همراه با فراموش کاری شده بود، در طی ۵ سال گذشته قادر به زندگی به تنهایی نیست و از ۶ ماه پیش نتوانسته است از بستر خود خارج شود و به جز تکرار بعضی از کلمات چیزی به زبان نیاورده است. او قادر به کنترل ادرار و مدفوع خود نیست و اختلال در بلع نیز پیدا کرده است. کدام داروی زیر از نظر FDA در این مورد مجوز تجویز دارد؟

الف) دونپزیل (ب) تاکرین (ج) ریواستیگمین (د) گالانتامین

۴۴. خانم ۶۶ ساله‌ای پس از سانحه سقوط از پله‌ها در بخش ICU بستری شده و دچار اختلال در شناخت اطرافیان و عدم آگاهی به زمان و مکان حادثه شده است سابقه DM; HTN و اختلال شنوایی دارد در سابقه معلم بازنشسته بود و تا قبل از حادثه عملکرد شناختی خوبی داشته است. کدام یک از موارد زیر predisposing بروز دلیریوم در این بیمار است؟

- الف) جنس مونث، سن بالای ۶۵ سال، سابقه فشار خون
ب) اختلال در شنوایی، عدم وجود شکستگی، سابقه پره مور بید خوب
ج) سن بالای ۶۵ سال، اختلال شنوایی، سابقه سقوط
د) اختلال شنوایی، جنس مونث، درمان با داروهای فشار خون

۴۵. در آقای ۷۵ ساله‌ای با سابقه دمانس که به علت شکستگی گردن خود در بیمارستان بستری شده و در حال حاضر دچار دلیریوم شده است کدام یک را کمتر توصیه می‌کنید؟

- الف) هالوپریدول ۱-۰/۵
ب) ریسپریدون روزانه ۰/۵-۱ میلی‌گرم
ج) لورازپام روزانه ۳-۰/۵ میلی‌گرم
د) الانزاپین روزانه ۱۵-۱۰ میلی‌گرم

۴۶. مجموعه این سه میانجی عصبی (نوراپی نفرین، سروتونین، گاما آمینوبوتیروئیک اسید) با کدام یک از نابسامانی‌های زیر مرتبط هستند؟

- الف) افسردگی یک قطبی
ب) اضطرابی
ج) روانپریشی
د) دو قطبی

۴۷. درمان مجازی virtual therapy در مورد کدام یک از نابسامانی‌های زیر به کار می‌رود؟

- الف) نابسامانی‌های اضطرابی عمومی
ب) آگورافوبیا
ج) نابسامانی پنیک
د) نابسامانی اضطرابی اجتماعی

۴۸. دختر ۱۸ ساله‌ای با دیدن گربه‌ها دچار ترس شدید می‌شود به طوری که اگر در جلوی دانشگاه گربه‌ای ببیند به خانه بر می‌گردد او در خانه یک سگ خانگی دارد و به خوبی هم از او مراقبت می‌کند او دچار کدام اختلال است؟

- الف) zoophobia
ب) ailurophobes
ج) mysophobia
د) cynophobia

۴۹. مرد ۳۰ ساله‌ای از ۷ ماه پیش دچار اضطراب شدید و بی‌مورد در خصوص عملکرد شغلی خود در اداره شده است بی‌قراری، تحریک پذیری، بی‌خوابی از علائم عمده دیگر اوست. او در بررسی‌های انجام شده بیماری جسمی خاص و یا مصرف مواد مخدر یا محرک مسبب این وضعیت ندارد. کدام داروی زیر بیش از همه در درمان او موثر است؟

- الف) دلوکستین
ب) ونلافاکستین
ج) لوومینتراسیپران
د) میلنا سیپران

۵۰. در کدام یک از بیماری‌های زیر بالاترین شیوع اختلال اضطراب منتشر دیده می‌شود؟

- الف) سندرم شوگرن
ب) کمبود ویتامین ب
ج) پرکاری تیروئید
د) کم کاری تیروئید

۵۱. کدام یک از محدوده‌های سنی زیر شامل young old می‌شود؟

- الف) ۶۱-۷۲
ب) ۵۱-۶۰
ج) ۷۱-۹۰
د) ۸۱-۹۰

۵۲. کدام یک از موارد زیر درباره افسردگی در سالمندان صحیح است؟

- الف) فقط افسردگی اساسی در سالمندان بیشتر از جوانان است
ب) افسردگی تحت بالینی در سالمندان بیشتر از جوانان است
ج) افسردگی اساسی و خفیف هر دو در سالمندان بیشتر از جوانان است
د) افسردگی اساسی و خفیف در سالمندان کمتر از جوانان است

۵۳. خانم ۷۵ ساله که به علت بی خوابی شبانه تحت درمان با ۲ میلیگرم دیازپام قبل از خواب می باشد به علت خواب آلودگی روزانه مراجعه کرده است. بهترین جایگزین چیست؟

- (الف) جایگزینی با اگزاپام ۱۰ میلیگرم قبل از خواب
(ب) جایگزینی با کلونازپام ۲ میلیگرم قبل از خواب
(ج) جایگزینی با آلپرزولام ۳ میلیگرم قبل از خواب
(د) جایگزینی با پرازپام ۲۰ میلیگرم قبل از خواب

۵۴. خانم ۸۰ ساله مبتلا به کانسر تخمدان که تحت درمان با داروهای سرتالین ۲۵ میلیگرم روزانه، اپرازول ۲۰ میلیگرم روزانه، دیگوکسین ۲۰۴ میلیگرم دچار دلیریوم شده است. با کدام یک از اقدامات زیر می توان ظرف چند روز علائم را برطرف کرد؟

- (الف) قطع داروی اپرازول
(ب) کاهش دوز داروی دیگوکسین
(ج) کاهش تدریجی سرتالین
(د) شیمی درمانی

۵۵. بیمار از سه هفته پیش احساس می کند از هیچ چیز لذت نمی برد، بی خواب و بی اشتها شده و تمرکز فکری را از دست داده است و پیوسته به مرگ می اندیشد. با توجه به مسائل آماری احتمال تعلق او به کدام گروه کمتر است؟

- (الف) اروپای شرقی (ب) آمریکای آفریقایی تبار (ج) جنوب شرقی آسیا (د) آمریکای مرکزی

۵۶. بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک با لیتیوم تحت کنترل است. اخیرا دچار افسردگی همراه با توهم شنوایی با این محتوا شده است که: «تو بی ارزش هستی، باید خود را از بین ببری» افزودن کدام یک از گزینه های زیر جهت او مناسب است؟

- (الف) افزایش دوز لیتیوم (ب) لامونتریژین (ج) ریسپریدون (د) هالوپریدول

۵۷. کدام یک از نظریه های زیر درباره افسردگی اساسی به ملانی کلاین منسوب است؟

- (الف) افسردگی ناشی از دست دادن حس احترام به خود و عزت نفس است
(ب) واکنشی به از دست دادن ابژه چه در واقعیت و چه در خیال است
(ج) ناشی از خشم درونی شده است که به صورت غیر منطقی متوجه خود می شود
(د) ترس از امنیت که فرد نتواند ابژه های (دیگران) خوب و ایده آل درونی شده را از تکانه های تخریبی محافظت کند.

۵۸. بیمار خانم جوانی است با سابقه خانوادگی اختلال خلقی که اخیرا با تابلو mixed state مراجعه کرده است، به خاطر قطع رابطه عاطفی اخیر، ۲ بار سعی داشته با خوردن قرص خودکشی کند، علائم به درمان ضد افسردگی ها پاسخ خوبی نداده است و با لاموترژین بهتر کنترل شده است. احتمال همراهی کدام اختلال شخصیت با تابلو بالینی وی بیشتر است؟

- (الف) مرزی (ب) خود شیفته (ج) نمایشی (د) انفعالی-تهاجمی

۵۹. در ارزیابی خطر خودکشی در بیماران دو قطبی وجود کدام یک از فاکتورهای زیر امکان خودکشی منجر به مرگ را (completed suicide) را افزایش می دهد؟

- (الف) سابقه سو استفاده جنسی در کودکی
(ب) سابقه تلاش برای خودکشی در خانواده درجه یک
(ج) فقدان حمایت روانی-اجتماعی
(د) ترخیص اخیر از بیمارستان

۶۰. نواحی مغزی زیر کمتر از همه به عنوان نواحی کلیدی مغزی در اختلالات خلقی در مطالعات تصویر نگاری مورد توجه هستند؟

- (الف) cortex orbital prefrontal
(ب) dorsolateral prefrontal
(ج) hippocampus and amygdala
(د) posterior cingulate cortex

۶۱. خانم ۳۰ ساله‌ای با سابقه دوره‌های همراه با پرخاشگری، شادی زیاد، کم خوابی و پر حرفی یک سال بعد از ازدواج حامله می‌شود و همان علایم دوباره شروع به برگشت می‌کند. در صورت تصمیم به استفاده از دارو به کدام یک از داروهای زیر در این بیمار ارجح است؟

الف) لیتیم کربنات ب) سدیم والپروات ج) کاربامازپین د) لاموتریژین

۶۲. مرد ۴۰ ساله‌ای در ۴ ماه گذشته دچار علایمی از پرخاشگری، بی‌قراری، ولخرجی، حواس پرتی و کم خوابی شده بود در طی ۸ هفته گذشته به کمک درمان دارویی هیچ علامت یا نشانه قابل ملاحظه‌ای از اختلال روانپزشکی را ندارد. کدام وضعیت زیر را در مورد ایشان مناسب می‌دانید؟

الف) recovery ب) full remission ج) partial remission د) full response

۶۳. مرد ۴۰ ساله‌ای به علت افسردگی و عدم لذت از زندگی همراه با کم خوابی، حواس پرتی و افکار مربوط به مرگ به دنبال مصرف ایمی پرامین دچار شادی بیشتر از حد معمول و پر تحرکی می‌شود. بر اساس تقسیم بندی Akiskal این بیمار در کدام گروه قرار می‌گیرد؟

الف) bipolar II ب) bipolar II 1/2 ج) bipolar III د) bipolar III 1/2

۶۴. بیماری که سابقه PTSD دارد شروع یادآوری خاطرات ناگواری که برای او اتفاق افتاده است کدام یک از موارد زیر با به یادآوری این خاطرات مربوط می‌شود؟

الف) cool cognition ب) hot cognition ج) delusional memory د) delusional perception

۶۵. در استرس مهاجرت کدام مورد صحیح است؟

الف) ادغام یا assimilation یک روند روان شناختی است که در مهاجرین جنگی رخ می‌دهد.

ب) در روند به حاشیه رانده شدن marginalization ارزش‌ها و رفتار کشور مقصد و مبدا مورد قبول نبوده است

ج) در صلاحیت دو فرهنگ bicultural competence فرد در فرهنگ کشور مبدا و مقصد احساس ناراحتی دارد

د) در هویت دو فرهنگی bicultural identity فرد در هر دو فرهنگ کارکرد مناسب ندارد.

۶۶. برای تخمین بار بیماری (burden of disease) از چه ملاکی استفاده می‌شود؟

الف) از روش متدهای جهانی global ب) ناتوانی انطباقی adjusted سال‌های زندگی

ج) از ECA= epidemiologic catchment area د) از علایم بالینی بیماری‌های روانی

۶۷. در تعریف رفتار جنسی طبیعی و اختلالات جنسی کدام عبارت درست است؟

الف) رفتار جنسی معمول احساس لذت به فرد و شریک جنسی را می‌دهد و هم چنین موجب تحریک و اعمال ارگان‌های جنسی می‌گردد

ب) با تغییر رفتارهای جنسی زمینه تحقیقات از اختلالات کارکرد جنسی و فیزیولوژیکال فاصله گرفته است

ج) در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده است که دامنه حساسیت در circumcised penis; uncircumcised penis تفاوت فاحشی دارد

د) در دیواره قدامی واژن از نظر بافتی شبیه vasdeferens است.

۶۸. عوامل موثر در پیش آگهی اعتیاد جنسی (sexual addiction) کدام عبارت درست است؟

الف) سن پایین در موقع شروع و مصرف الکل از عوامل تعیین کننده پیش آگهی بد برای اختلال مذکور می‌باشد

ب) وجود اضطراب در پیش آگهی نقش آشکاری ندارد

ج) هسته اصلی پاتولوژی بیماری جدا از هیجانات و عواطف فرد می‌باشد

د) یک نوع اعتیاد حاد می‌باشد که با درمان دارویی و روان درمانی مناسب سریعاً بهبودی می‌یابد.

۶۹. کدام یک از موارد زیر جز طبقات تشخیصی DSM-IV-TR در مورد اختلال عملکرد جنسی نیست؟

- (الف) آقای جوانی که به علت مصرف مواد دچار کاهش میل جنسی شده است
(ب) خانم جوانی که نمی‌تواند حین رابطه جنسی ارگاسم را تجربه کند
(ج) آقای جوانی که پس از رابطه جنسی دچار خلق افسرده، تحریک پذیری و بی‌قراری می‌شود
(د) خانم جوانی که حین رابطه جنسی دچار درد ناحیه واژن می‌باشد

۷۰. در خصوص عوارض داروهای زیر کدام یک صحیح نیست؟

- (الف) سرتالین بیشترین عوارض جنسی را در میان SSRI ها دارد
(ب) ریسپریدون می‌تواند عارضه افزایش پرولاکتین ناشی از SSRI ها را سرکوب کند
(ج) دری پرامین کمترین میزان کژکاری جنسی را بین ضد افسردگی‌های هتروسیکلیک دارد
(د) ترانیل پسرورمین به دلیل خواص شبه آفتماین می‌تواند تحریک کننده جنسی باشد.

۷۱. خانم جوانی با شکایت آمنوره اولیه مراجعه کرده است. در بدو تولد فنوتیپ زنانه داشته و پستان‌ها رشد N1 دارند. کدام یک

از موارد زیر می‌تواند اتیولوژی این اختلال باشد؟

- (الف) دیس ژنری گنادی X6 (ب) آژنزی مولرین (ج) هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (د) اشکال در رسپتور اندروژن

۷۲. آقای ۴۵ ساله به دلیل ورشکستگی اقتصادی ناشی از باختن در قمار به شما مراجعه کرده است و اظهار می‌دارد و نمی‌تواند

این قمار را ترک کند کدام یک از درمان‌های زیر تا حدودی موثر است.

- (الف) SSRI (ب) درمان‌های ضد اضطراب (ج) SGAS (د) Gabapentin

۷۳. در بیماری کردن مو کدام عبارت درست است؟

- (الف) تغییرات مغزی مشابه بیماران توره می‌باشد
(ب) در نقشه‌های مغزی پوتامن چپ این بیماران رشد زیادی داشته است
(ج) سروتونین و هموایلک اسید بالا می‌باشد و با درمان کاهش نمی‌یابد
(د) در مردان جوان شایع‌تر است

۷۴. مرد ۲۸ ساله‌ای را با تقلیل شدید حرکات ارادی فقدان و تکلم، واکنش طبیعی نسبت به نور، صدا و لمس به اورژانس آوردند.

در معاینه بالینی، تون عضلانی و تنفس طبیعی جلوه می‌کرد توام با محدودیت حرکات هماهنگ چشمی کدام تشخیص


محتمل‌تر است؟

- (الف) multiple sclerosis (ب) dissociative stupor (ج) آسیب midbrain (د) trunq visorvel


۷۵. کدام یک از نمودارهای زیر در خصوص شیوع اپیدمیولوژیک علایم تجزیه‌ای (dissociation) در جامعه (general

population) صادق است؟


(ب) normal distribution




(الف) left- skewed distribution



(د) linear distnbution



(ج) night- skewed distn moution



۷۶. آقای میان سالی پس از برخورد پر استرس در محل کار با رئیسش به علت اختلال حافظه ناگهانی به صورت پیش گستر و پس گستر به بخش اورژانس مراجعه کرده است و به شدت از اختلال حافظه خود نگران است. نام و اطلاعات شخصی خود را نمی‌داند در سابقه پزشکی فشار خون، DM، و سردرد را ذکر می‌کند. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

(الف) به بیمار اطمینان بخش کرد و ترخیص می‌شود

(ب) با احتمال تشخیص malingering تست آموباربتال درخواست می‌شود

(ج) میگرن و صرع می‌تواند در اتیولوژی اختلال نقش داشته باشد

(د) این اختلال با حوادث استرس زا ارتباطی ندارد

۷۷. پروپرانولول چه اثری بر کابوس دارد؟

(الف) اثر افزایشی (ب) اثر کاهشی

(ج) گاه افزایشی و گاه کاهشی

(د) اثری ندارد

۷۸. خانم میان سالی با شکایت از بی خوابی به کلینیک خواب مراجعه کرده است. پس از گذراندن یک شب در آزمایشگاه خواب ذکر می‌کند تا شروع خوابش بیش از ۲ ساعت طول کشیده و بارها از خواب بیدار شده است و حتی یک ساعت هم به صورت مداوم خواب نبوده در حالی که پلی سمنوگرافی نشان می‌دهد که فرد بیش از ۸۰ درصد موثر بده و سریع به خواب رفته است. کدام یک از موارد زیر در مورد بیمار صادق نیست؟

(الف) ممکن است هم زمن تظاهرات وسواسی در مورد عملکرد هیجانی داشته باشد

(ب) این اختلال می‌تواند نشانه هذیان سوماتیک باشد

(ج) این اختلال maligeriy به صورت شایع دیده می‌شود

(د) داروهای ضد اضطرابی در درمان این اختلال موثر هستند

۷۹. دختر خانم جوانی با تمایل شدید به لاغری و کاهش وزن شدید مراجعه کرده است. در مصاحبه باور دارد که چاق است و باید وزن بیشتری کم کند. اهمیت زیادی به تبلیغات رسانه‌ها در مورد مزایای لاغری بودن می‌دهد. در خانواده مادرش سابقه اختلال خلقی داشته و او را مورد سوء رفتار قرار می‌داده است. کدام یک از موارد اشاره شده به صورت اختصاصی با اختلال خوردن وی ارتباط ندارد:

(الف) جنس مونث

(ب) سابقه مورد سوء رفتار واقع شدن

(ج) تاثیر تبلیغات رسانه‌ای

(د) سن نوجوانی

۸۰. در درمان بی اشتهایی عصبی

(الف) غالباً به علت سوء تغذیه سطح ثابت پلاسمایی داروی داده شده پایین می‌ماند

(ب) داروهای ضد سایکوز آتیپیکال در درمان اختلال خوردن خط اول درمان بوده و موجب افزایش اشتها (ego- dystonic) می‌گردد

(ج) درمان شناختی- رفتاری در اختلال پرخوری و بی اشتهایی عصبی به یک اندازه موثر در خط اول درمان می‌باشد

(د) در درمان بی اشتهایی عصبی افراد با وزن ۷۰ درصد وزن نرمال ابتدا رژیم غذایی را با ۱۵۰۰ کالری روزانه شروع و هر چهار روز ۵۰۰ کالری می‌توان افزایش داد.

۸۱. خانم بارداری به علت احساس افسردگی و بی حوصلگی مراجعه کرده است کدام مقیاس زیر را جهت غربالگری افسردگی پیشنهاد می‌کنید؟

(الف) edinlourgh postnatal depression scale

(ب) beck depress scale

(د) hamiltion

(ج) SCIA

۸۲. آقای میان سالی به دنبال جراحی تعویض مفصل در ICU بستری است. دچار اختلال در آگاهی به زمان و مکان شده و تحریک پذیری دارد. نسبت به اطرافیان و کادر پزشکی بدبین است. در مشاوری انجام شده کدام یک از موارد زیر را توصیه نمی‌کنید؟

- الف) کاهش سر و صدای محیط
ب) افزایش زمان ماندن در ICU
ج) بهبود سیکل خواب شب و روز
د) ایجاد محیط خصوصی

۸۳. آقای مسنی با سابقه بیماری قلبی در مصرف داروهایی که نام آنها را نمی‌داند دچار توهم بینایی شده است. وضعیت شناختی باید NL است و سایر علائم سایکوتیک را تجربه نمی‌کند. کدام یک از داروهای زیر می‌تواند عامل بروز این حالت باشد؟

- الف) دیگوکسین
ب) لیدوکائین
ج) آمیودارون
د) تیازیدها

۸۴. خانم جوانی با دردهای شکمی مراجعه کرد که با دفع مدفوع شل بهتر می‌شود و از ۳ ماه قبل شروع شده مراجعه کرده است. در مصاحبه روان پزشکی به علت ابتلا بر افسردگی و وسواس شدید هم زمان تحقق درمان با داروهای ضد افسردگی، روان درمانی و دوز پایین داروی ضد سایکوز است. در کدام یک از موارد زیر کمترین ارتباط را با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دارد؟

- الف) مصرف داروی ضد افسردگی
ب) روان درمانی
ج) مصرف داروی ضد سایکوز
د) درد شکمی

۸۵. برای آقای مسنی با سابقه مصرف سیگار و ابتلا به سرطان ریه از نوع small cell carcinoma به علت خلق افسرده، بی‌انگیزگی و کاهش انرژی مشاوری روانپزشکی درخواست شده است کدامیک از رویکردهای زیر جهت تشخیص افسردگی حساسیت بیشتری داشتند و برای شرایط بالینی مناسب‌تر است؟

- الف) رویکرد Inclusive که در آن تمام علائم افسردگی جزء تشخیص افسردگی در نظر گرفته می‌شود.
ب) رویکرد substitutive که در آن علائم سوماتیک معادل علائم روانشناختی در نظر گرفته می‌شود.
ج) رویکرد اتیولوژیک که علائم فقط وقتی محسوب می‌شود که واضحاً ناشی از بیماری مدیکال نباشد.
د) رویکرد Exclusive که علائم سوماتیک حذف می‌شود.

۸۶. آقای ۱۸ ساله‌ای به علت ابتلا به آکنه و لگاریس تحت درمان می‌باشد. کدامیک از موارد زیر در مورد ایشان درست است؟

الف) نتیجه بهتر درمان بیمار در همراهی با درمانهای سایکولوژیکال بوده و قطع آنها باعث عود آکنه می‌شود.
ب) گزارشهای موردی درباره بهبود آکنه با تجویز سرتالین وجود دارد.
ج) دارودرمانی در افسردگی این بیمار مهمترین نقش را دارد.
د) شدت افسردگی در این بیمار با شدت ارتباط درد.

۸۷. خانم ۳۰ ساله‌ای با شکایت کهیر از ۶ ماه قبل مراجعه کرده است. بهترین درمان کدام است؟

- الف) دیفن هیدرامین ۲۵mg شبها ۱ عدد
ب) دوکسپین ۱۰mg سه بار در روز
ج) هیدروکسی زین ۵۰mg دوبار در روز
د) پروپرانولول ۱۰mg سه بار در روز

۸۸. آقای ۴۵ ساله با شکایت آلودگی با پارازیت‌ها، احساس خزیدن لارو در زیر پوست و شنیدن صدای آنها و خارش شدید مراجعه کرده است. بهترین درمان کدام است؟

- الف) هالوپریدول
ب) ECT
ج) Pimozide
د) Risperidone

۸۹. براساس شواهد علمی موجود دوز کدامیک از داروهای زیر در درمان اختلال پانیک کمتر توصیه شده است؟

- (الف) پاروکستین شروع ۱۰-۵ و ادامه ۶۰-۲۰ روزانه
(ب) ونلافاکسین (غیر آهسته رهش) شروع از ۲۵-۶/۲۵ و ادامه ۱۵۰-۵۰ روزانه
(ج) ونلافاکسین X-R شروع از ۳۷/۵ و ادامه ۲۲۵-۱۵۰ روزانه
(د) کلومی پرامین شروع از ۱۲۵-۵۰ و ادامه ۳۰۰-۲۰۰ روزانه

۹۰. در خصوص تظاهرات بالینی GAD کدامیک از موارد زیر صادق است؟

- (الف) طول دوره علائم حاد حداقل یک ماه است.
(ب) تنش موتور می تواند به صورت بی قراری و سردرد تظاهر کند.
(ج) وجود علائم تنها در یک حوزه فعالیت برای تشخیص کافی است.
(د) اغلب یک اختلال MEDICAL غیر روانپزشکی مشخص در آنها یافت می شود.

۹۱. کودکی ۵ ساله با علائم قشقرق شدید، تحریک پذیری مزمن و خلق عصبانی مراجعه کرده است. کدامیک از موارد فوق با

تشخیص DMDD در DSM-5 همخوانی ندارد؟

- (الف) سن کودک (ب) قشقرق شدید (ج) تحریک پذیری مزمن (د) خلق عصبانی

۹۲. کدامیک از موارد زیر جزء طبقه بندی Depressive Disorders در DSM-5 قرار نمی گیرد؟

- (الف) دیس تایمی
(ب) Persistent Complex Bereavement Disorder
(ج) Premenstrual dysphoric disorder
(د) Disruptive mood dysregulation disorder

۹۳. کدامیک از موارد زیر در خصوص فرایندهای ایمنولوژیک درماتیت آتوپیک صحیح است؟

- (الف) در مراحل حاد IL-4 پایین و IFN-8 پایین است
(ب) در مراحل حاد IL-4 بالا و IFN-8 بالا است
(ج) در مراحل حاد IL-4 پایین و IFN-8 بالا است
(د) در مراحل حاد IL-4 بالا و IFN-8 پایین است

۹۴. سندرم acarophobia عبارت است از:

- (الف) Dysmorpho phobia
(ب) Haptic Hallucination
(ج) Monomania
(د) Delusional Parasitosis

۹۵. مرد ۶۵ ساله ای با سابقه ناراحتی قلبی، به خاطر آژیتاسیون و بیقراری به روانپزشکی مراجعه و چند ساعت پس از دریافت قرص دچار ایست قلبی شده و فوت می نماید. در آخرین EKG حين CPR QTc= 550 milliseconds مشاهده می گردد.

کدام داروی زیر محتملترین نقش را در این واقعه داشته است؟

- (الف) Diazepam (ب) Haloperidol (ج) Carbamazepine (د) Chlorpromazine

۹۶. خانم ۳۵ ساله ای با سابقه Bipolar تحت درمان لیتیوم است و اخیراً دچار افسردگی شده است. کدامیک از درمانهای زیر را

پیشنهاد می کنید؟

- (الف) افزایش لیتیوم در سطح خونی ۱/۲-۱/۵
(ب) افزایش لیتیوم در سطح خونی ۱/۵-۱/۸
(ج) افزایش لیتیوم در سطح خونی ۱-۱/۲
(د) افزایش لیتیوم در سطح خونی ۱-۰/۸

۹۷. کدامیک از موارد زیر درباره میزان عوارض جنسی مصرف ونلافاکسین صحیح است؟

- الف) ۳۰-۴۰٪ (ب) ۲۰-۳۰٪ (ج) ۱۰-۲۰٪ (د) ۵٪

۹۸. کدامیک از عوارض زیر بیشتر در مصرف Mirtazapin دیده می‌شود؟

- الف) کاهش اشتها و افزایش خواب‌آلودگی (ب) کاهش اشتها و کاهش خواب
ج) افزایش اشتها و افزایش خواب‌آلودگی (د) افزایش وزن و کاهش خواب‌آلودگی

۹۹. سطح خونی مناسب والپروات سدیم در درمان حمله حاد مانیا در چه حدود است؟

- الف) ۵۰-۱۵۰ میکرو گرم در سی سی (ب) ۵۰-۱۰۰ (ج) ۱۵۰-۲۰۰ (د) ۲۰۰-۲۵۰

۱۰۰. در fMRI از بیماران دچار روانگسیختگی (اسکیزوفرنی) افزایش فعالیت بادامه (آمیگدالا) در مواجهه با ترس با چه متغیرهایی رابطه دارد؟

- الف) با توانایی شناسایی هیجان در چهره و حالت عاطفی طبیعی
ب) با توانایی شناسایی هیجان در چهره و شدت حالت عاطفی تخت (flat affect)
ج) با ناتوانی از شناسایی هیجان در چهره و حالت عاطفی طبیعی
د) با ناتوانی از شناسایی هیجان در چهره و شدت حالت عاطفی تخت

۱۰۱. مبانی نظری صرفه‌جویی بُن (token economy) کدامند؟

- الف) شرطی‌سازی کلاسیک و شرطی‌سازی فعال (ب) شرطی‌سازی فعال و یادگیری مشاهده‌ای
ج) شرطی‌سازی کلاسیک و یادگیری مشاهده‌ای (د) شرطی‌سازی کلاسیک و فعال و یادگیری مشاهده‌ای

۱۰۲. کدامیک از گزینه‌ها بیانگر مدیا تورهای بیولوژیک مؤثر روی خطر الکلیسم می‌باشد؟

- الف) اختلال دوقطبی (ب) اختلال شخصیت وسواسی (ج) آنزیم‌های ALT و AST (د) اختلالات شناختی

۱۰۳. بیماری از هفته‌ها قبل روزانه بیش از ۵ drink الکل مصرف می‌کند. به نظر شما کدامیک از آزمایشات زیر بیانگر وضعیت بیمار می‌باشد؟

- الف) alanin aminotransferase 30 IU/L (ب) aspartate aminotransferase 40 IU/L
ج) carbohydrate-deficient transferrin = 2% (د) glutamyltransferase = 40 U/L

۱۰۴. کدامیک از موارد زیر ناشی از تأثیر کانابیس روی سیستم ایمنی می‌باشد؟

- الف) کاهش تعداد لنفوسیت‌های T (ب) کاهش تعداد لنفوسیت‌های B
ج) کاهش تعداد ماکروفاژها (د) اختلال در پاسخدهی لنفوسیت‌های T به میتوژن‌ها

۱۰۵. آقای ۳۵ ساله‌ای بدنال سوءمصرف اکسید نیترو دچار اختلالات نورولوژیک شده است. کدامیک از داروهای زیر را تجویز می‌کنید؟

- الف) Vit B12+folate (ب) Vit B6+folate (ج) Vit B1 (د) نیاسین

۱۰۶. در مورد تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (TMS) کدام عبارت صحیح است؟

- الف) میدانهای مغناطیس مستقیماً ایجاد ضربات الکتریکی می‌کنند
ب) می‌تواند مانند الکتروشوک درمانی تحریکات موضعی مغزی ایجاد کند
ج) برای بیماران افسرده شدید و مقاوم به درمان TMS نهایتاً درمان طلایی استاندارد شده است
د) بهترین کاندیدا برای درمان با TMS بیماران افسرده مقاوم به درمانهای دارویی ضدافسردگی هستند

۱۰۷. رزیدنت روانپزشکی برای خانم ۳۰ ساله‌ای با اختلال اسکیزوافکتیو تصمیم به استفاده از کاربامازپین می‌گیرد ولی با بررسی عوارض دارویی و سابقه بیماری، تصمیم او به اکسکابازپین تغییر می‌یابد. کدامیک از عبارتهای زیر با توجه به شیوع بیشتر در استفاده از کاربامازپین در این تصمیم نقش داشته است؟

- الف) دیسکرازی های خونی شدید
ب) بثورات جدی پوستی
ج) بثورات خوش خیم پوستی
د) کمبود سدیم خون

۱۰۸. بیمار ۳۵ ساله ای به توهم شنوایی و هذیان گزند و آسیب مبتلا شده است. بعد از سپری شدن فاز حاد روانپزشک باید برای استفاده از داروهای ضدروانپریشی به عنوان درمان نگهدارنده تصمیم بگیرد. کدام روش درمانی را تأیید می‌کنید؟

- الف) بعد از اولین حمله سایکوز ۱ تا ۲ سال، بعد از دومین حمله ۵ سال و بعد از سومین حمله تا آخر عمر
ب) بعد از اولین حمله سایکوز ۶ تا ۹ ماه، بعد از دومین حمله ۲ سال و بعد از سومین حمله تا ۵ سال
ج) بعد از اولین حمله سایکوز ۶ ماه تا ۱ سال، بعد از دومین حمله ۳ سال و بعد از سومین حمله تا ۵ سال
د) بعد از اولین حمله سایکوز ۶ ماه تا ۲ سال، بعد از دومین حمله ۳ تا ۵ سال و بعد از سومین حمله تا آخر عمر

۱۰۹. خانم بیست ساله ای بعد از زایمان برای افسردگی نیاز به دارو دارد. او حاضر به قطع شیر خود نیست. روانپزشک با سابقه قبلی که از او دارد تصمیم به استفاده از یک SSRIs می‌گیرد. کدام داروی زیر مناسب تر است؟

- الف) اس سیتالوپرام
ب) سیتالوپرام
ج) فلووکسامین
د) فلوکستین

۱۱۰. مرد ۲۵ ساله ای به علت ابتلا به اختلال دوقطبی قرار است تحت درمان با لاموتریژین قرار گیرد. این بیمار به علت ابتلا به صرع از یک داروی ضد صرع نیز استفاده می‌کند. روانپزشک دارو را بسیار با احتیاط و با دوز کم و نیز تیتراسیون آهسته شروع می‌کند. از بین داروهای زیر داروی ضد صرع بیمار کدام است؟

- الف) فنی توئین
ب) فنوباریتال
ج) کاربامازپین
د) سدیم والپروات

۱۱۱. روانپزشک برای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا تصمیم گرفته شده است تا داروی کلرپرومازین او را به هالوپریدول تبدیل کند. او در حال دریافت ۴۰۰ میلی گرم کلرپرومازین است. میزان معادل برای تبدیل به هالوپریدول چقدر است؟

- الف) ۶ میلی گرم
ب) ۸ میلی گرم
ج) ۱۰ میلی گرم
د) ۲۵ میلی گرم

۱۱۲. بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا تحت درمان با ۲۴ میلی گرم پرفنازین است. کدام عبارت زیر در مورد تداخل دارویی در این بیمار صحیح است؟

- الف) در همراهی با وارفارین باعث کاهش در زمان خونریزی می‌شود
ب) سیگار سطح خونی دارو را افزایش می‌دهد
ج) دیگوکسین باعث کاهش جذب دارو می‌شود
د) در طی دو ساعت بعد از مصرف سایمتیدین باعث افزایش جذب دارو می‌شود

۱۱۳. در یک بیمار ۴۰ ساله مبتلا به ADHD با وزن ۱۲۰ کیلوگرم، رزیدنت روانپزشکی داروی اتوموکستین را شروع کرده است ولی بعد از سه ماه نتیجه درمانی حاصل نشده است. افزایش دوز دارو در این بیمار تا چه سقفی مجاز است؟

- الف) ۶۰ میلی گرم
ب) ۱۰۰ میلی گرم
ج) ۱۲۰ میلی گرم
د) ۱۸۰ میلی گرم

۱۱۴. کدام SSRIs توسط FDA هنوز به عنوان یک داروی ضد افسردگی برگه تأیید ندارد؟

- الف) سرتالین
ب) فلوکستین
ج) فلوکسامین
د) پاروکستین

۱۱۵. خانم ۴۰ ساله‌ای با اختلال دوقطبی تحت درمان با لیتیم کرینات است. بعد از سه هفته او دچار درد شکمی، استفراغ، خشکی دهان، تاری دید و آتاکسی شده است. از بین اقدامات زیر کدام یک به عنوان اولین قدم درمانی قابل قبول است؟
 (الف) تجویز مایعات فراوان
 (ب) تجویز فلومازنیل و شارکول فعال شده
 (ج) تجویز محلول پلی اتیلن گلیکول
 (د) همودیالیز

۱۱۶. در پارکینسونیسم دارویی کدام عبارت صحیح است؟

(الف) بعد از قطع داروی آنتی سایکوتیک تا ۲ هفته علائم غالباً باقی بماند.
 (ب) در افراد مسن علائم پارکینسون بعد از قطع داروی ضد سایکوز بلافاصله بهبود میابد.
 (ج) داروی آنتی کولینرژیک را تا یک سال تجویز و بعد از آن بررسی مجدد میکنیم.
 (د) زنان و مردان جوان در خطر بیشتر ایجاد پارکینسونیسم دارویی هستند.

۱۱۷. خانم ۴۰ ساله ای که از حدود ۲۰ سال پیش دچار گوشه گیری اجتماعی، خنده های بیجا، اعتقاد به داشتن قدرت برتر در جهان شده است، به دنبال مصرف هالوپریدول دچار لرزش دستها و کندی حرکات بدنی شده است. از بین گزینه های زیر کدام روش درمانی را پیشنهاد می کنید؟

(الف) الکتروشوک درمانی
 (ب) کاهش دوز هالوپریدول و استفاده از آرتان
 (ج) استفاده از آرتان و رفتار درمانی
 (د) تغییر هالوپریدول به ریسپریدون و آرتان

۱۱۸. خانم طلاق گرفته ۵۰ ساله ای با سابقه دو روره افسردگی، از ۴ ماه پیش اعتقاد پیدا کرده است که همسر سابقش ارتباط پنهانی با زنان دارد. با وجود عدم ارتباط قانونی و عرفی، مدام برای او دردسر ایجاد می کند. کدام مورد نشانه ای از پیش آگهی خوب است؟

(الف) جنسیت زن
 (ب) وضعیت طلاق
 (ج) نوع هذیان
 (د) سابقه افسردگی قبلی

۱۱۹. مرد ۲۵ ساله ای بدون هیچ مشکل قبلی از دو ماه پیش به طور ناگهانی از رفتن به سر کار امتناع می ورزد و بعد از دو هفته شروع به جمع کردن پیچ و مهره در خیابان می کند و بلافاصله با هوشیاری کامل و با چهره ای بی حرکت و صدایی منوتون از اعتقاد خود مبنی بر تزریق ماده ای سمی توسط برادرش از طریق ساعت مچی اش صحبت می کند. به نظر شما کدام علامت نشانه پیش آگهی بد است؟

(الف) شروع دو هفته ای جمع کردن پیچ و مهره در خیابان
 (ب) چهره بی حرکت و صدای منوتون
 (ج) هوشاری کامل
 (د) عملکرد بسیار خوب قبلی

۱۲۰. همه موارد زیر جزء همبسته های شادکامی (happiness) هستند به جز:

(الف) مذهبی بودن
 (ب) متأهل بودن
 (ج) برونگرا بودن
 (د) درآمد مکفی داشتن

۱۲۱. آقای ۶۰ ساله ای پس از بازنشستگی دچار احساس پوچی، بی ارزشی و عدم رضایت از زندگی از زندگی؛ علائم گوشه گیری، پرخاشگری و مشکلات ارتباطی شده است. کدام درمان را به وی پیشنهاد می کنید؟

(الف) psychodynamic
 (ب) Interpersonal
 (ج) CBT
 (د) Narrative

۱۲۲. درمانگر T.A به آقا می گوید: "به جای اینکه هیچ واکنشی نشان ندهی بهتر است حداقل خشم را ابراز کنی". درمانگر از کدام مفهوم تحلیل تبدیلی استفاده می کند؟

(الف) stroke
 (ب) game
 (ج) life script
 (د) telle

۱۲۳. ترکیب دارودرمانی و روان درمانی در مورد اختلالات بسیاری پیشنهاد شده است با این وجود پژوهش ها نشان می دهند برخی اختلالات از روان درمانی به تنهایی بیشتر سود می برند. کدامیک از اختلالات زیر جزء مواردی است که از رواندرمانی به تنهایی بیشتر سود می برد؟

الف) dysthymia ب) anorexia ج) substance abuse د) OCD

۱۲۴. درمانگری با رویکرد DBT روی یکپارچه کردن هیجان و ذهن منطقی و رسیدن به "wise mind" تمرکز می کند. وی در کدام مرحله مهارتی قرار دارد؟

الف) distress tolerance ب) mind fullness
ج) interpersonal effectiveness د) emotion regulation

۱۲۵. درمانگر با رویکرد short-term Anxiety proroking psychotherapy (STAPP) برای کدام دسته از افراد نیز می تواند این درمان را به کار بندد؟

الف) فقدان های چندگانه ب) سوء مصرف مواد ج) اختلال پانیک با آگورافوبیا د) وابستگی افراطی

۱۲۶. دختری ۲۰ ساله معتقد است اعتماد به نفس پایینی دارد چون نمی تواند جواب جنس مخالف خود را خوب بدهد، در حالی که وی به راحتی می تواند سخنرانی کند و در بین اعضای فامیل، دوستان دانشگاهی و کار نیمه وقت خود بسیار محبوب است و به راحتی صحبت می کند. خطر شناختی وی چیست؟

الف) arbitrary inference ب) dichotomous thinking
ج) overgeneralization د) selective abstraction

۱۲۷. پسر ۲۵ ساله ای دائماً در ذهن خود فکر میکند من زشتم و هیچ کس از من خوشش نمی آید. درمانگر به او می گوید: چه فکری باعث می شود اینقدر به "من زشتم" فکر کنی؟ روش درمانگر چیست؟

الف) mindfulness ب) guided discovery ج) meta cognition د) downward arrow

۱۲۸. خانواده درمانگر برای بازگرداندن قدرت به والدین و تغییر موضع قدرت از بچه ها به پدر با پدر خانواده ای اتحاد برقرار کرده و سعی میکند به تدریج روشهای خانواده را اصلاح و در سلسله مراتب درستی از قدرت قرار دهد. رویکرد وی چیست؟

الف) bowenian ب) strategic ج) structural د) solution-focused

۱۲۹. بیمار مبتلا به اختلال اضطرابی توسط درمانگر آنالیز می شود، وی از ابتدای جلسه دوم بی وقفه شروع به صحبت می کند و بر روی موضوعی در گذشته، به شدت پافشاری می کند به طوری که درمانگر تلاش می کند او را به موقعیت فعلی بازگرداند، رفتار بیمار حاکی از چه نوع پدیده ای است؟

الف) بیانگر شکل گیری پدیده انتقال است ب) بیانگر پدیده مقاومت است
ج) از اشکال برقراری رابطه است د) به عنوان تداعی آزاد در جریان هر آنالیزی دیده می شود

۱۳۰. در جریان تحلیل، درمانگر سعی می کند با بکارگیری تکنیک ها، بعضی وقایع روانی را که بایستی بیمار با آن روبرو شود را پررنگ تر سازد، ابهام یا سردرگمی را با جدا کردن جنبه های مهم از غیر مهم بزداید و زمینه را برای فهم و درک بیمار از خودش و محتوای ناخودآگاه مشکلاتش ایجاد نماید، این فرایند با استفاده از چه تکنیکهایی میسر است؟

الف) interpretation – clarification – confrontation ب) interpretation – working through
ج) clarification – confrontation – suggestion د) positive transference – real relation

۱۳۱. هدف از این نوع درمان، بازسازی خود و توانایی کنار آمدن، تثبیت تعادل و قوی ساختن دفاعهاست به طوریکه فرد، آسیب را بپذیرد و با محیط بهتر انطباق پیدا کند و از نشانه‌ها رهایی یابد. ان تعریف شامل کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

- الف) روان‌درمانی تحلیلی نوع کلاسیک
ب) روان‌درمانی تحلیلی نوع بیانی
ج) روان‌درمانی تحلیلی نوع حمایتی
د) روان‌درمانی کوتاه مدت دیالکتیکی

۱۳۲. در جریان پروسه هیپنوتیزم، بیمار خاطرات و وقایع گذشته را در ذهن مرور می‌کند، ناگهان صدایش کودکانه می‌شود، مثل آنها می‌نویسد و خود را کاملاً کودک می‌بیند، این پدیده عبارت است از:

- الف) revivification ب) ideomotor activity ج) age progression د) time distortion

۱۳۳. هدف از اینگونه درمان که به صورت کوتاه مدت برگزار می‌شود بهبود روابط بین فردی، افزایش عملکرد اجتماعی بیمار و کاهش نشانه‌های روانپزشکی است، با این توصیف؛ کدام دسته از بیماران زیر ممکن است کمتر از شیوه فوق سود ببرند؟

- الف) مبتلایان به اختلالات خلقی
ب) مبتلایان به سوءمصرف مواد
ج) مبتلایان به اختلالات خوردن
د) مبتلایان به PTSD

۱۳۴. سیستم‌های کلیدی مغزی که در فعالیت یادگیری نظام مند و تداعی شده‌ی temperament درگیر هستند؟

- الف) سیستم لیمبیک و استریاتوم ب) سیستم لیمبیک و هیپوکامپ
ج) نئوکورتکس تمپورال د) نئوکورتکس فرونتال

۱۳۵. آقای مجرد ۳۵ ساله و بیکار، با علائمی به صورت بدبینی به اطرافیان، عقاید عطف به خود، گاهی رفتارها و افکار عجیب و غریب و انزوای اجتماعی مراجعه کرده است، مادرش می‌گوید از دوره دبیرستان کم و بیش مشکلاتی داشته است و با کسی به غیر از اعضاء خانواده رابطه‌ای ندارد، یک بار هم به دلیل افسردگی بستری شده است. برادر بیمار نیز مبتلا به اسکیزوفرنیاست، محتملترین تشخیص کدام است؟

- الف) اختلال هذیانی ب) اسکیزوفرنیا ج) اختلال شخصیت اسکیزوتیپال د) اختلال اسکیزوافکتیو

۱۳۶. خانم ۲۵ ساله‌ای به علت احساس اضطراب و خجالت در روابط اجتماعی مراجعه کرده است، در مصاحبه خود را فرد بی‌کفایتی می‌داند و نگران قضاوت دیگران درباره خود است به همین دلیل کمتر در فعالیت‌های جمعی مشارکت می‌کند، یک یا دو بار هم دچار حمله پانیک شده است. در تشخیص افتراقی کدام یک از انواع اختلال شخصیت با احتمال کمتری درباره وی مطرح است؟

- الف) اسکیزوئید ب) پارانوئید ج) وابسته د) وسواسی-جبری

۱۳۷. فردی در پرسشنامه چهار وجه مزاج نمره بالا در صفات مصمم بودن، ساعی بودن، مشتاق و ایده‌آل‌گرا بودن و نمره پایین در صفات عمل‌گرایی و تبلی به دست آورده است. کدام یک از ناقل‌های شیمیایی زیر در وضعیت وی بیشترین نقش را دارد؟

- الف) دوپامین ب) گابا، سروتونین و نورال رافه
ج) گلوتامات، سروتونین و نورال رافه د) نوراپی نفرین، سروتونین و مدیال رافه

۱۳۸. فردی با علائم و نشانه‌های اشتغال ذهنی با ترس از رها شدن، تلاش شدید برای جلب حمایت و مراقبت دیگران، اعتماد به نفس پایین، عدم جرأت‌مندی و عدم توان به عهده گرفتن مسوولیت مراجعه کرده است. کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

- الف) سطح اجتماعی - اقتصادی و عملکرد در ازدواج بالاتر است
ب) اختلالات خلقی و اضطرابی در وی شایعتر است
ج) شایعترین اختلال شخصیت همراه هیستریونیک، avoidant و مرزی است
د) در معرض social phobia و اختلالات انطباقی است

۱۳۹. از فعالیت های خلاقانه (همچون هنر، موزیک، نوشتن و امثالهم) جهت ارتقاء یا تصحیح کدام یک از مشکلات زیر استفاده به عمل می آید تا در نهایت به رشد شخصیت کمک نماید؟

- الف) social dysregulation
ب) emptiness
ج) mood dysregulation
د) cognitive distortion

۱۴۰. از دولکستین جهت تعدیل کدام یک از وجوه بیمارگونه شخصیتی استفاده به عمل می آید؟

- الف) chronic somatic anxiety
ب) chronic cognitive anxiety
ج) acute and sever anxiety
د) emotional lability

۱۴۱. مرد ۲۸ ساله ای با سابقه طولانی ۱. اعتماد به نفس پایین ۲. احساس عجز و ناراحتی در هنگام تنهایی ۳. ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران و ۴. تمایل به تقبل مسوولیت از سوی دیگران در امورات اصلی زندگی اش، مراجعه کرده است. کدام اختلال شخصیتی محتملتر است؟

- الف) avoidant
ب) dependent
ج) NoS
د) narcissistic

۱۴۲. انفارکتوس قلبی از همراهی و عوارضی است که در اختلالات شخصیت بیشتر دیده می شود.

- الف) پارانوئید
ب) اسکیزوتایپال
ج) وسواسی - جبری
د) اسکیزوئید

۱۴۳. وقتی ساختار شخصیتی والد منتقد به قدر کافی وجود ندارد، کودک مستعد چه اختلالی می گردد؟

- الف) تنبلی نارسسیستیک
ب) جامعه ستیزی
ج) افسردگی
د) رفتارهای خودتخریبی

۱۴۴. فردی در پروفایل شخصیتی آزمون NEO، نمره نورو تیسم (N) بالا و توافق (A) پایین کسب کرده است. کدام اختلال شخصیت را پیش بینی می کنید؟

- الف) پارانوئید
ب) اسکیزوئید
ج) اجتنابی
د) نمایشی

۱۴۵. از دیدگاه فرانز الکساندر تعارض ابراز وجود برای مقابله با نیازهای وابستگی افراطی منجر به اختلال می گردد.

- الف) فشار خون
ب) آرتریت روماتوئید
ج) زخم گوارشی
د) آسم

۱۴۶. کدام یک از مکانیسم های دفاعی زیر با تکیه بر حفظ سلامت و انطباق اجتماعی در چرخه زندگی بکار میرود و در حوزه و انسجام بخشی به نیازهای فردی، توقعات اجتماعی و روابط بین فردی است؟

- الف) externalization
ب) anticipation
ج) repression
د) intellectualization

۱۴۷. مرد ۶۵ ساله مبتلا به نارسایی کبد همراه فرزندان خود برای ارزیابی روانپزشکی به درمانگاه مراجعه می کند. او از حدود ۳ ماه پیش به سختی مطالب درج شده در روزنامه ها را به خاطر می آورد و در حل کردن جدول نیز سرعت قبل را ندارد. در این مدت برنامه ریزی دیدار ماهیانه با دوستان قدیمی را که از سال ها پیش عهده دار هماهنگی آن بوده است را نیز انجام نداده است و موجب رنجش آن ها شده است. کدام یک از موارد زیر برای او مناسب تر است؟

- الف) normal aging
ب) mild neurocognitive disorder
ج) amnestic disorder
د) dementia

۱۴۸. پسر ۱۰ ساله با علائم اختلال پوستی مزمن که با خارش و التهاب و بثورات اریتماتور و ماکولر پاپولر همراه است از بخش پوست ارجاع شده است. اقدامی که بیشترین کمک را به بیمار بکند کدام است؟

- الف) تشویق والدین به توجه و مراقبت بیشتر فرزند
ب) تشویق والدین به مستقل کردن فرزند
ج) آموزش بیمار در مورد درک عمل ذهن ناخودآگاه
د) روان درمانی حمایتی

۱۴۹. اثرات خارج هرمی داروهای آنتی سایکوتیک ناشی از بلوک رسپتورهای کدام یک از سیستم های دوپامینرژیک دوپامینی است؟

- الف) مزوکورتیکال
ب) مزولیمبیک
ج) بتوبروهیپوفیزیال
د) نیگرواستراتیال

۱۵۰. بیمار با حملات ناگهانی ترس شدید همراه با تپش قلب، لرزش بدن، تنگی نفس، درد قفسه سینه، تهوع که در عرض چند دقیقه به اوج می رسد و در ماه چند بار تکرار می شود مراجعه کرده است، بیمار همیشه نگران وقوع حمله بعدی است و این ترس او را خانه نشین کرده است. کدام یک از زوجهای دارویی زیر توسط FDA برای درمان این وضعیت پذیرفته شده است؟

- الف) آلپرازولام – پاروکستین
ب) آلپرازولام – سرتالین
ج) ونلافاکسین – بوسپیرون
د) ونلافاکسین – تمازپام

پاسخنامه امتحان کتبی دستیاران - اردیبهشت ماه ۹۶

سوال	الف	ب	ج	د
۱۰۱				
۱۰۲				
۱۰۳				
۱۰۴				
۱۰۵				
۱۰۶				
۱۰۷				
۱۰۸				
۱۰۹				
۱۱۰				
۱۱۱				
۱۱۲				
۱۱۳				
۱۱۴				
۱۱۵				
۱۱۶				
۱۱۷				
۱۱۸				
۱۱۹				
۱۲۰				
۱۲۱				
۱۲۲				
۱۲۳				
۱۲۴				
۱۲۵				
۱۲۶				
۱۲۷				
۱۲۸				
۱۲۹				
۱۳۰				
۱۳۱				
۱۳۲				
۱۳۳				
۱۳۴				
۱۳۵				
۱۳۶				
۱۳۷				
۱۳۸				
۱۳۹				
۱۴۰				
۱۴۱				
۱۴۲				
۱۴۳				
۱۴۴				
۱۴۵				
۱۴۶				
۱۴۷				
۱۴۸				

سوال	الف	ب	ج	د
۵۱				
۵۲				
۵۳				
۵۴				
۵۵				
۵۶				
۵۷				
۵۸				
۵۹				
۶۰				
۶۱				
۶۲				
۶۳				
۶۴				
۶۵				
۶۶				
۶۷				
۶۸				
۶۹				
۷۰				
۷۱				
۷۲				
۷۳				
۷۴				
۷۵				
۷۶				
۷۷				
۷۸				
۷۹				
۸۰				
۸۱				
۸۲				
۸۳				
۸۴				
۸۵				
۸۶				
۸۷				
۸۸				
۸۹				
۹۰				
۹۱				
۹۲				
۹۳				
۹۴				
۹۵				
۹۶				
۹۷				
۹۸				

سوال	الف	ب	ج	د
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				
۴۸				

نام و نام خانوادگی:

با امید به موفقیت تمامی شما عزیزان،
لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. پاسخها حتماً به صورت (× ضربدر) و داخل کادر باشد.

۲. پاسخها با خودکار آبی یا مشکی مشخص شود.

۳. در صورت مشاهده بیشتر از یک پاسخ برای یک سوال، نمره‌ای به سوال مورد نظر تعلق نخواهد گرفت.

نمره کل:

تأیید مسؤول آموزش دستیاری

تأیید مدیر گروه

				۱۴۹
				۱۵۰

				۹۹
				۱۰۰

				۴۹
				۵۰