

به نام خدا



دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

آزمون کتبی دستیاران روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

۱۸ دیماه ۱۳۹۵

۱. بیمار از یک سال پیش صداهایی می شنود که درباره او حرف می زنند، احساس می کند که از سوی گروهی در معرض خطر مرگ است. کارکرد او مختل است. درمان به سه گروه از داروهای خط اول و دوم این عارضه موثر نبوده است. به عنوان مقاوم، تحت درمان با داروی مناسب قرار می گیرد. پس از یک سال درمان بدون عارضه، آزمایش مکرر و ضروری جهت او هر چند وقت یکبار باید انجام شود؟

الف) هر هفته (ب) هر دو هفته (ج) هر ماه (د) هر دو ماه

۲. ویژگیهایی که ذکر می شود مربوط به کدام گزینه است: "بر پایه پویایی های خانوادگی و بین فردی؛ نقش تسلیم پذیر در رابطه با فرد دیگر درگیر؛ تحت تاثیر عوامل شخصیتی یا محدودیت های هوشی؛ انزوای اجتماعی ناشی از عوامل شخصیتی - فقر - اشکالات زبانی یا انزوای جغرافیایی؟"

الف) مسائل رابطه ای relation problems (ب) نابسامانیهای هذیانی نوع jealous (ج) اختلال روانپریشی شراکتی shared (د) روانپریشی وابسته به فرهنگ culture-bound

۳. بیمار با چهره غمگین، پرخواری، پرخوابی، و عزت نفس پایین مراجعه کرده است. در پاسخ به پرسش روانپزشک معلوم می شود از دو سال پیش به این وضع مبتلا است. او به بیماری جسمی یا روانی دیگر مبتلا نیست و سوءمصرف مواد هم ندارد. این وضعیت باعث مشکلات تحصیلی، شغلی و خانوادگی عمده برای او شده است. با توجه به تاریخ طبیعی این نوع اختلال، آغاز آن نه در این بیمار مفروض بلکه به طور کلی از چه زمانی محتمل تر است؟

الف) کودکی یا نوجوانی (ب) جوانی (ج) میانسالی (د) سالمندی

۴. بیمار دوره های متناوب گاه خلق افسرده و افزایش خواب و اشتها، اضطراب شدید و هذیانهای نیست انگاری دارد و گاه خلق بالا، افزایش فعالیت روانی - حرکتی، عزت نفس اغراقی و هذیانهای بزرگمنشی دارد. کدام یک از داروهای زیر به تنهایی برای کنترل او مؤثرتر است؟

الف) کلوزاپین (ب) کوئیتاپین (ج) لیتیوم (د) اولانزاپین

۵. در مورد درمان فوری و مداوم و پیشگیرانه بیماری دوقطبی همه گزینه های زیر صحیح است به جز:

الف) به وسیله داروهای متعادل کننده خلق باعث افزایش BDNF می شود
ب) از بروز دوره ها به صورت موثرتری پیشگیری می کند
ج) به وسیله داروهای ضدروانپریشی آتیپیک باعث جلوگیری از کاهش BDNF می شود
د) داروهای ضدافسردگی در دوره افسردگی این وضعیت سبب کاهش BDNF می شود

۶. کدام یک از بیماران مبتلا به unipolar depression به احتمال بیشتری به آگمنتاسیون داروهای ضد افسردگی با لیتیوم پاسخ خواهند داد؟

الف) بیماران افسرده با سابقه فامیلی اختلال دوقطبی
ب) بیماران افسرده با سابقه فامیلی اسکیزوفرنی
ج) بیماران افسرده ناشی از بیماری طبی
د) بیماران افسرده بدون سابقه فامیلی

۷. وجود کدام یک از شرایط زیر در مبتلایان اختلال دوقطبی احتمال rapid switching را در اقوام فرد مبتلا افزایش می‌دهد؟

- (الف) وجود rapid cycling در بیمار
(ب) همراهی اختلال پانیک در بیمار
(ج) همراهی سایکوز در بیمار
(د) وجود هیپرتایمیا در بیمار

۸. کدام یک از مکانیسم‌های تنظیم ژن در اختلال دوقطبی در دسته اپی‌ژنتیک قرار دارد؟

(الف) anticipation
(ب) heterogeneity
(ج) variable expressing
(د) imprinting

۹. کمبود کدام یک از ویتامین‌های زیر می‌تواند جزء علل سندرم‌های هذیانی باشد؟

(الف) ویتامین D
(ب) تیامین
(ج) ویتامین A
(د) ویتامین B6

۱۰. خانم ۳۵ ساله مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی که مدتها تحت درمان بوده است با شکایت بی‌نظمی‌های menstrual و گالاکتوره مراجعه کرده است. کدام یک از داروهای زیر انتخاب بهتری برای ایشان است؟

(الف) ریسپریدون
(ب) هالوپریدول
(ج) کوئتیاپین
(د) تری فلوئوپرازین

۱۱. در درمانگاه اورژانس بیمارستانی در یک شهر اروپا، مرد جوانی از یک کشور حاره‌ای به علت شکستگی استخوان ران مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در پاسخ به این سوال که چه چیز باعث شکستگی شد به پزشک می‌گوید به علت بی‌احترامی به پرنده‌ای که روح پدر بزرگش در آن حلول کرده بود دچار این عارضه شده است. جراح درخواست مشاوره روانپزشکی می‌کند. روانپزشک چه باید انجام دهد؟

- (الف) تجویز داروی ضد روانپریشی
(ب) بررسی وضعیت فرهنگی بیمار
(ب) شناخت درمانی
(د) رفتار درمانی جدلی

۱۲. این ویژگیها به طور عام ناشی از چه اختلالی است؟ "تعصب، تفکر کلیشه‌ای، واکنش‌های تک بعدی، واکنش همه یا هیچ به موقعیت‌های پیچیده"

- (الف) نارسایی در تفکر انتزاعی
(ب) اسکیزوفرنیا
(ج) هوشبهر پایین
(د) نابسامانیهای عضوی ذهن

۱۳. مردی چهل ساله به علت شکستگی درشت نی و نازک نی چند روز در بیمارستان بستری و جراحی شده است. هنگام مرخصی در یادآوری تاریخ روز و ماه و ساعت ناتوان است. در مورد او کدام یک از گزینه‌ها صحیح است؟

(الف) این موضوع در آن شرایط عموماً بهنجار است
(ب) ممکن است به طور عمده در اثر هوشبری باشد
(ج) نوعی واکنش تجزیه‌ای (دی سوسیاتیو) است
(د) ناشی از نارسایی توجه/بیش‌فعالی باقیمانده است

۱۴. خانم چهل ساله عنوان می‌کند که مامور جمع‌آوری زباله که هر روز به کوچه می‌آید در واقع شوهر اوست که خود را به این شکل درآورده است. نام این علامت چیست؟

- (الف) سندرم فرگولی
(ب) سندرم کاپگراس
(ج) سندرم کوتارد
(د) سندرم کلرامبو

۱۵. احساس اینکه "چیزی مثل کرم زیر پوست وول می‌خورد" بیشتر در ترک کدام یک از موارد زیر ممکن است دیده شود؟

- (الف) کوکائین
(ب) تریاک
(ج) الکل
(د) حشیش

۱۶. کدام یک از موارد زیر در **right brain thinking** مشاهده نمی شود؟

- الف) درک توالی خطی زمان
ب) وجود همزمان تناقض ها
ج) غالب بودن تخیل
د) وجود افکار خلاقانه

۱۷. روانپزشک از آقای ۴۵ ساله ای در مورد شغلش سوال می کند و او پاسخ می دهد نانوا هستم. سپس در مورد وضعیت تأهل و تحصیلاتش می پرسد که با کمال تعجب همان پاسخ را می شنود. کدام علامت زیر با وضعیت بالینی این بیمار هماهنگ است؟

- الف) verbigeration ب) perseveration ج) palilalia د) echolalia

۱۸. مردی که از بیست سالگی دچار کری شده است را با شکایت از شنیدن مداوم صدای موسیقی و آواز استاد شجریان به درمانگاه روانپزشکی آورده اند. کدام عبارت زیر با وضعیت بالینی این بیمار هماهنگ است؟

- الف) complex hallucination ب) Charles bonnet syndrome
ج) command hallucination د) parallel phenomenon

۱۹. خانم ۳۰ ساله ای با شکایت از ضعف و درد اندام تحتانی و ناتوانی نسبی در به دست گرفتن خودکار در هنگام نوشتن با اصرار خانواده و بعد از ماه ها تحمل علائم فوق به پزشک مراجعه می کند. اقدامات پاراکلینیکی درخواست شده توسط پزشک را بعد از دو ماه انجام می دهد. بعد از شش ماه دیگر قادر به نوشتن نیست ولی از مراجعه به پزشک خود سر باز می زند. کدام عبارت زیر با وضعیت بالینی این بیمار هماهنگ است؟

- الف) somatopagnosia ب) autotopagnosia
ج) astereognosia د) dynosognosia

۲۰. خانم ۲۵ ساله ای با شکایت از درد قفسه سینه، تپش قلب، احساس تنگی نفس، لرزش و ترس از مردن به اورژانس داخلی مراجعه کرده است. ارزیابی کامل طبی نشانه ای از بیماری قلبی یا تنفسی نشان نداده و بیمار به شما ارجاع شده است. با توجه به تشخیص احتمالی بیمار کدام علامت جزء معیارهای تشخیص این اختلال نیست؟

- الف) تعریق ب) احساس کوتاه شدن تنفس ج) تکرر ادرار د) کزکز (پارستزی)

۲۱. آقای ۳۲ ساله راننده آژانس شیفت شب از رانندگی در خیابانهای خلوت در تاریکی وحشت دارد و باید بایستد تا ماشین دیگری بیاید و به دنبالش وارد خیابان شود. اگر تنها باشد دچار ترس شدید، و علائم جسمی متعدد مثل تپش قلب، تهوع و تعریق میشود. در مورد اپیدمیولوژی این اختلال کدام صحیح است؟

- الف) شایعترین اختلال روانی در زنان است. ب) ۹۰٪ بیماران لااقل به یک اختلال روانی دیگر مبتلا هستند.
ج) اوج شروع اختلال در نوجوانی است. د) نسبت ابتلا در زنان و مردان بستری یکسان است.

۲۲. خانم ۲۸ ساله ای معتقد است بدنش بوی بدی دارد که دیگران متوجه آن نمیشوند. این اشتغال ذهنی منجر به رفتارهای تکراری مثل شستن بدن یا تعویض لباس میشود. با توجه به تشخیص احتمالی کدام صحیح است؟

- الف) در زنان و مجردها شایعتر است. ب) بیمار معمولاً بینش ضعیفی دارد.
ج) معمولاً در نوجوانی شروع میشود. د) التهاب سینوس پیشانی از تشخیصهای افتراقی این اختلال است.

۲۳. کدامیک از اختلالات شخصیت در تشخیص افتراقی اختلال اضطراب - افسردگی بیشتر مطرح شده است؟

- الف) مرزی ب) وسواسی - جبری ج) اسکیزوئید د) افسرده

۲۴. در مورد اولین مصاحبه با بیمار روانپزشکی همه گزینه ها صحیح است به جز:

الف) معمولاً ۹۰-۴۵ دقیقه باید اختصاص یابد

ب) برای بیمار روانپزش ۳۰-۲۰ دقیقه مناسب است

ج) برای تکمیل ارزیابی ممکن است بیش از یک جلسه لازم باشد

د) مصاحبه نود دقیقه ای به معنی کسب تاریخچه جامع و دقیق است

۲۵. بیمار مردی است ۳۵ ساله به دنبال مشکلات شدید مالی و طلاق همسر در یک روز برفی به روانپزشک مراجعه کرده است. ضمن صحبت هایش می گوید: "خانه او اکنون خیلی خالی است و سرما او را رنج می دهد". روانپزشک چنین تعبیر می کند که این مرد بدون همسر محبوبش خانه را خالی حس می کند و چندبار هم این تعبیر را به کار می برد، اما متوجه می شود گویا مرد متوجه این تعبیر او نیست. کدام گزینه را باید به کار برد؟

الف) اطمینان بخشی درباره بهبود اوضاع

ب) تصدیق وضع هیجانی بیمار

ج) پرسش درباره شبکه حمایت خانوادگی و اجتماعی بیمار

د) واضح سازی گفته بیمار

۲۶. آقای ۳۵ ساله ای که ه علت سوءمصرف حشیش به اورژانس مراجعه کرده است می گوید "یکی از چیزهایی که من در رابطه با همسرم دوست دارم رنگ و لعاب صدا و خنده هایش است که به رنگ قهوه ای - طلایی فوق العاده می باشد. که درست شبیه نان برشته و ترد آغشته به کره است. من می دانم که خیلی عجیب به نظر می رسد ولی بسیار واقعی است" کدام علامت برای توصیف گفته ی بالا مناسب تر است؟

الف) imagery ب) synesthesia ج) polinopsia د) methamorphosia

۲۷. کدام موقعیت زیر بیانگر عاطفه نامتناسب است؟

الف) بیماری می گوید افسرده است اما لبخند می زند

ب) بیماری که در حین مراسم سوگواری می خندد

ج) بیماری که از دیسترس شدید شاکی است اما چهره اش حاکی از آن ناراحتی نیست

د) بیماری که احساس هیجانی اش نسبت به اتفاقات پیرامونش کاهش یافته است

۲۸. فردی با شنیدن صدا وزش باد در میان شاخه های درختان از پشت پنجره اتاق خوابش فکر می کند اسم او را صدا می زنند، چه نوع اختلال درکی مطرح است؟

الف) illusion ب) imperative auditory hallucination

ج) hypnagogic hallucination د) functional hallucination

۲۹. در جریان مصاحبه بیمار با تردید می گوید، مشکلات زیادی با خانواده دارم اما نمی دانم لازم است راجع به آنها حرف بزنم؟ روانپزشک می گوید: صحبت کردن درباره هر چیزی که باعث ناراحتی شما شده مهم است، من از شما می خواهم که درباره خانواده حرف بزنید هر جا که ببینیم از موضوع خارج هست به شما می گم. تکنیک فوق عبارت است از:

الف) reinforcement ب) education ج) reassurance د) encouragement

۳۰. در خودکشی کدام عبارت صحیح است؟

الف) در بین دانشجویان سنین کالج چهارمین یا سومین علت منجر به مرگ است

ب) بعد از ۵۵ سالگی مجددا خودکشی افزایش و بالا رفتن شیب دوم منحنی خودکشی را نشان می دهد

ج) پایین بودن سطوح 5-HT اختصاصی جهت بررسی خطر خودکشی است

د) ترومای دوران کودکی (سوء استفاده جسمی - جنسی) فرد را جهت افسردگی و رفتارهای تکانه ای مثل خودکشی مستعد می سازد

۳۱. در افراد افسرده علایم در افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند با آنهایی که چنین اقداماتی را انجام نمی‌دهند چیست؟

- الف) افراد افسرده ای که نا امیدند بیشتر در خطر افسردگی هستند
ب) افرادی که پرخاشگرند افکار افسردگی کمتری دارند و خشم بیشتری را نشان می‌دهند
ج) الکل به عنوان آگونیست خارجی برای گیرنده های سروتونینی عمل کرده و خطر خودکشی را کاهش میدهد
د) افرادی که در معرض خطر خودکشی هستند در سوالات مستقیم در مورد خودکشی جواب مناسب نمی‌دهند

۳۲. کدام گروه در معرض خطر خودکشی بالاتری هستند؟

- الف) نوجوانان ب) سالمندان ج) میانسالی د) جوانان

۳۳. تمامی موارد زیر از شاخصه های "توان تصمیم گیری" در بیمار است، به جز:

- الف) جمع آوری اطلاعات اساسی لازم برای اخذ تصمیم
ب) درک روش های مختلف درمانی قابل دسترس
ج) فهم نتیجه دریافت یا عدم دریافت درمان
د) ادغام تمامی داده های مرتبط جهت تصمیم گیری در راستای منافع خویش

۳۴. در موارد زیر روانپزشک می تواند بدون اخذ رضایت از بیمار درمان را آغاز نماید، به جز:

- الف) زمانی که با استفاده از "حق ویژه درمانی" و برای اجتناب از بروز خطر برای بیمار یا اختلال در قدرت تصمیم گیری اش اجباراً اطلاعات لازم را از وی دریغ می‌دارد
ب) بیمار ناتوان از اخذ تصمیم است
ج) بیمار از پیش، از واگذاری حق درمان به پزشک خودداری ورزیده باشد
د) برای اجتناب از بروز خطر جدی برای بیمار یا سایرین ارائه درمان اورژانسی ضروری باشد

۳۵. کدام یک از موارد زیر شایعترین نوع سوءرفتار با سالمند محسوب می‌گردد؟

- الف) physical ب) financial ج) neglect د) somatic

۳۶. کدام یک از موارد زیر شایعترین نوع سوءرفتار با کودک محسوب می‌گردد؟

- الف) sexual abuse ب) emotional mistreatment ج) physical abuse د) neglect

۳۷. در مورد فرکانس ویزیت بیماران کدام عبارت صحیح است؟

- الف) بیماران بدحال هفته ای ۱ یا ۲ بار کافی است
ب) در درمانهای طولانی مدت فاصله ۶ ماه برای ویزیت کافی است
ج) ۴ ماه یکبار حداقل زمان ویزیت در درمان نگهدارنده است
د) در درمان پیگیری بیماران فاصله هفته ای مناسب می‌باشد

۳۸. در درمان با داروی لیتیوم کدام عبارت صحیح است؟

- الف) می‌تواند تغییرات دایمی و پایداری در هورمونهای تیروئید ایجاد شود
ب) در زنان خصوصاً در دو سال اول درمان تولید هیپرتریویدی می‌کند
ج) در حدود ۲۰٪ افرادی که آن را طولانی مدت مصرف میکنند اشکالات هورمون تیروئید ایجاد می‌کند
د) اگر بیماری تحت درمان با لیتیوم است و دوره های افسردگی ظاهر شود احتمال هیپوتیرویدیسم (کم کاری تیروئید) ایجاد شده با لیتیوم باید مد نظر باشد

۳۹. در بیماران اسکیزوفرنی و الکتروشوک درمانی کدام عبارت صحیح است؟

- (الف) وجود علائم مثبت / کاتاتونی / علائم عاطفی بهتر به درمان الکتروشوک جواب می دهند
(ب) الکتروشوک غالباً ارجحیت به داروی ضد سایکوز دارد
(ج) درمان با الکتروشوک در موارد حاد و مزمن اسکیزوفرنی تجویز شده و در درمان هر دو مورد موثر است
(د) تجویز لیتیوم و ضد سایکوزها همراه با الکتروشوک امکان پذیر است

۴۰. در مورد جراحیهای عصبی - روانشناختی کدام عبارت صحیح است؟

- (الف) موجب بهبودی علائم در ۷۰-۴۰٪ موارد میگردد
(ب) اگر ضایعات اعصاب مرکزی باشند بهتر جواب می دهند
(ج) سن بالای ۶۵ نقشی در تصمیم گیری جراحیهای مذکور ندارد
(د) برای جراحی مدت بیماری کمتر از یکسال باشد پیش آگهی مناسبی دارد

۴۱. خانم ۶۵ ساله مبتلا به مشکل گوارشی و نارسایی کبدی که تحت درمان با سایمتیدین است دچار افسردگی مازور شده

است. کدام یک از گزینه ها بهترین انتخاب برای درمان است؟

- (الف) حداکثر ۶۰ میلیگرم دولوکستین در روز
(ب) حداکثر ۲۰ میلیگرم سیتالوپرام در روز
(ج) حداکثر ۶۰ میلیگرم میرتازاپین در روز
(د) حداکثر ۲۰۰ میلیگرم نورتریپتیلین در روز

۴۲. خانم ۳۵ ساله مبتلا به اختلال روانپزشکی که تحت درمان دارویی است با شکایت گالاکتوره مراجعه کرده است. به

نظر شما کدام یک از داروهای زیر باعث بروز این عارضه شده است؟

- (الف) آریپیپرازول (ب) الانزاپین (ج) سرتالین (د) کلوزاپین

۴۳. آقای ۲۵ ساله که به علت افسردگی تحت درمان با فلوکستین است با شکایت تعریق زیاد در حد خیس شدن ملحفه

ها مراجعه کرده است. اقدام شما کدام است؟

- (الف) درخواست CBC diff (ب) درخواست آزمایش کارکرد تیروئید
(ج) تجویز ترازوسین (د) تجویز بی پریدین

۴۴. خانم ۳۰ ساله مبتلا به اسکروزمولتیپل که تحت درمان با داروی محرک است با شکایت کابوس شبانه مراجعه کرده

است. بهترین اقدام کدام است؟

- (الف) کاهش مقدار مصرف دارو (ب) جایگزینی دارو
(ج) ایجاد همپوشانی لازم بین وعده های دارو (د) استفاده از فراورده های کوتاه اثر

۴۵. خانم ۴۵ ساله مبتلا به اختلال دوقطبی که تحت درمان با والپروات و کاربامازپین می باشد دچار هیپرآمونمی و ترمور

خشن شده است. بهترین اقدام چیست؟

- (الف) تجویز ال-کارنتین به بیمار (ب) قطع مصرف والپروات و دریافت پروتئین
(ج) پایش منظم بیمار از نظر دریافت مایعات و تغذیه (د) پایش سطح آمیلاز سرم

۴۶. خانم ۴۵ ساله مبتلا به اختلال افسردگی مازور با افکار خودکشی پس از دریافت ۱۰ جلسه ECT بهبودی کسب نکرده

است. توصیه بعدی شما کدام است؟

- (الف) قطه ECT و استفاده از روشهای درمانی متفاوت (ب) به کار بردن روش ECT های متعدد پایش شده
(ج) با جاگذاری دوطرفه الکتروود و با شدت بالا اقدام به درمان کنیم (د) استفاده از تشنج های تاخیری

۴۷. آقای ۴۰ ساله مبتلا به افسردگی و وسواس شدید کاندید دریافت عصب جراحی شده است. کدام یک از موارد مانع جدی برای کاربرد عصب جراحی است؟

- الف) نمره ۳۰ در مقیاس ییل براون
ب) نمره بالاتر از ۳۰ در مقیاس بک
ج) نمره ۴۰ در مقیاس ارزیابی کارکرد کلی
د) وجود اختلال سوءمصرف مواد روانگردان

۴۸. برای آقای ۳۵ ساله مبتلا به اختلال خلقی و کاتاتونیا که در بررسی پارزی انگشتان پا، ضایعه ای فضاگیر در MRI ناحیه لامبار یافت شده است ECT تجویز شده است. گزینه درست در مورد بیمار کدام است؟

الف) جراحی ضایعه فضاگیر قبل از دریافت ECT
ب) انجام ECT توسط افراد خبره
ج) ECT در این بیمار ممنوعیت مطلق دارد
د) انجام ECT یکطرفه

۴۹. کدام یک از موارد زیر درباره restless leg syndrome صحیح است؟

الف) شیوع بیماری یک و نیم برابر است
ب) ماساژ عضلات ساق پا تاثیری ندارد
ج) اغلب در مصرف SSRI دیده نمی شود
د) معمولاً در نوجوانان دیده می شود

۵۰. آزمونگر از بیمار می خواهد به سرعت جانوران را نام ببرد، سپس از او می خواهد اشیایی را که با حرف "م" آغاز می شوند نام ببرد کدام یک از گزینه های زیر در این مورد مصداق ندارد؟

الف) بررسی معنایی
ب) بررسی آواشناختی
ج) بررسی فصاحت کلامی
د) بررسی زبان ادراکی

پاسخنامه امتحان کتبی دستیاران - دیماه ۹۵

سوال	الف	ب	ج	د
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				
۴۸				

نام و نام خانوادگی:

.....

با امید به موفقیت تمامی شما عزیزان،

لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. پاسخها حتماً به صورت (X ضربدر) و داخل کادر باشد.

۲. پاسخها با خودکار آبی یا مشکی مشخص شود.

۳. در صورت مشاهده بیشتر از یک پاسخ برای یک سوال، نمره‌ای به سوال مورد نظر تعلق نخواهد گرفت.

نمره کل:

.....

تأیید مسؤول آموزش دستیاری

تأیید مدیر گروه

				۴۹
				۵۰