

به نام خدا



دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آزمون کتبی دستیاران روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱۳۹۳ دیماه ۲۷

۱- علائم و نشانه هایی که بیشتر بیانگر اتیولوژی طبی برای علائم روانی می باشد کدام دسته است؟

(الف) شروع حاد (ساعت تا هفته) / سیر موج و نوسانی / اختلال در جهت یابی (disorientation)

(ب) سوء مصرف الکل یا مواد / اختلال حافظه / شروع مزمن و آهسته

(ج) توهمات بینایی یا شنوایی / سیر ثابت و یکسان / سابقه قبلی بیماری طبی و نزولوژیک

(د) سن بالای ۴۰ سال و کمتر از ۱۲ سال بدون سابقه روانی / علائم حیاتی طبیعی / عدم وجود اختلال جهت یابی

۲- کدام یک از عبارات زیر جزو عوامل خطر در خودکشی نمی باشد؟

(د) دمانس

(ج) اختلال شخصیت پارانوئید

(ب) نزد سفید پوست

(الف) همجنس باز بودن

۳- شایعترین فرم Abuse سالمندان کدام است؟

(د) drug abuse

(ج) financial exploration

(ب) neglect

(الف) physical abuse

۴- آقای ۳۰ ساله به دنبال ترک مصرف آمفتامین به اورژانس مراجعه کرده است. در بررسی های به عمل آمده یافته های مثبت شامل افزایش خواب، احساس غمگینی، افزایش اشتتها، اضطراب، کاهش انرژی و رویاهای ناخوشایند، دردهای عضلانی می باشد. کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می کنید؟

(ب) توصیه به استراحت در محیط آرام با خواب و تغذیه مناسب

(د) تجویز ECT

(الف) بستری اورژانس در بخش روانپزشکی

(ج) تجویز داروی ضدافسردگی در اورژانس

۵- مرد جوانی با علائم آزیتاسیون و پرخاشگری شدید را نیروی انتظامی به اورژانس آورده است. اطلاعاتی از سابقه قبلی فرد در دست نمی باشد و علت وضعیت فرد مشخص نیست اما احتمال روانپریشی کم است، کدام یک از داروهای زیر را جهت کنترل فرد انتخاب می کنید؟

(ب) Lorazepam 2mg IM

(الف) Ziprasidone 20g IM

(د) Olanzapin 5mg IM

(ج) Haloperidol 5mg IM

۶- کدام یک در خصوص ریسک مرگ بر اثر خودکشی در طول عمر (lifetime risk) صحیح است؟

(ب) برای سایر اختلالات خلقی حدود ۱۰٪ است

(الف) برای بیماری دوقطبی حدود ۵٪ است

(د) برای افسردگی یک قطبی حدود ۳٪ است

(ج) برای اسکیزوفرنیا حدود ۲۰٪ است

۷- کدام یک از موارد زیر در خودکشی های تروریستی نقش کمتری دارد؟

(د) اختلال روانپزشکی

(ب) کینه توزی

(الف) مذهب

(ج) قتل

۸- بیمار می گوید: از یک ماه قبل به دنبال طلاق، احساس می کنم سبک شده ام. مصاحبه گر در اینجا چه باید انجام دهد؟

(ب) واضح سازی Clarifying

(الف) کندو کاو Probing

(د) تداعیها Assiciations

(ج) راهنمایی Leading

۹- شاعری جیغ را به رنگ بنش و زمزمه را به رنگ سبز می‌بینند. در اینجا به چه وضعیتی روبرو هستیم؟

ب) نمادسازی symbolization

الف) توهمندی بینایی visual hallucination

د) حس آمیزی synesthesia

ج) وحدت عرفانی unio – mystical

۱۰- مجرم ادعا می‌کند حین ارتکاب جرم تحت تاثیر ماده‌ای بوده و عدمی در ارتکاب جرم نداشته است اما در آزمایش

ادرار که ۱۸ ساعت پس از جرم انجام شده، اثری از هیچ ماده یا متابولیت‌های آن یافت نشده است. به فرض صحت

گفته مجرم، کدامیک از مواد زیر مورد سوءصرف قرار گرفته است؟

د) آمفاتامین

ج) مورفین

الف) الکل

۱۱- در ارزیابی هوشی پسر ۱۸ ساله‌ای از مقیاس هوش وکسلر III استفاده شد و نتایج به صورت performance

verbal IQ بالا گزارش شده است. بر اساس نتایج به دست آمده کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

الف) نقص حل مساله اجرایی و جنرال وجود دارد

ب) ممکن است بیمار افسردگی داشته باشد

ج) می‌تواند نشان دهنده سندرمهای نورولوژیک همراه با علائم حرکتی باشد

د) تفاوت این دو IQ تنها ناشی از آسیب نیمکره راست است

۱۲- پزشک حین مصاحبه سعی می‌کند با تشویق بیمار را جهت پرداختن بیشتر به یک موضوع که انکار شده یا دست کم

گرفته شده، راهنمایی کند. نام تکنیک بکار رفته چه می‌باشد؟

د) probing

education

leading

الف) clarifying

۱۳- مرد ۷۲ ساله‌ای بجای استفاده از چاقو برای بریدن سعی دارد این کار را با خودکار انجام دهد. مشکل به وجود آمده

چه نام دارد و ناشی از آسیب کدام بخش مغز است؟

ب) ideomotor limb apraxia

الف)

آسیب نیمکره چپ

د) ideational errors

ج) آسیب نیمکره چپ

د) آسیب نیمکره چپ

۱۴- گزینه صحیح در مورد بصیرت (Insight) کدام است؟

الف) میزان insight نشان دهنده severity بیمار نیست

ب) بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی همیشه بصیرت خوبی دارند

ج) بیماران سایکوتیک همیشه نسبت به بیماری خود بصیرت خوبی ندارند

د) ظرفیت خرد برای گرفتن بهترین تصمیم و عمل بر اساس آن نشان دهنده بصیرت است

۱۵- خانم ۶۰ ساله‌ای با سابقه بیماری قلبی با حملات طیش قلب و تعریق و لرزش اندام‌ها به پزشک مراجعه کرده است.

بیمار طی حملات هوشیاری خود را از دست می‌دهد. حملات طی ده دقیقه برطرف می‌شوند. همه موارد زیر به نفع

اختلال ارگانیک است به جز:

ب) سابقه بیماری قلبی

الف) شروع در سن ۶۰ سالگی

د) حملات ده دقیقه طول می‌کشند

ج) از دست دادن هوشیاری طی حملات

- ۱۶- بیماری به علت اختلال پانیک به مدت چند سال تحت درمان با ۲۰ میلیگرم پاروکستین و ۲ میلیگرم کلونازپام می باشد. با این دوز داروها تحت کنترل می باشد. کدام روش را در مورد ادامه درمان ترجیح می دهید؟
- ب) ادامه مصرف کلونازپام با همان دوزی که بیمار را کنترل کرده است.
- الف) لزوم کاهش تدریجی داروها و ارزیابی مجدد
- ج) تغییر کلونازپام به آلپرازولام
- د) جایگزین کردن MAOI به جای کلونازپام

۱۷- داروی ونلافاکسین در کدام مورد زیر مورد تأیید FDA نمی باشد؟

- OCD (د) OCD (ج) پانیک (ب) SAD (الف) GAD

۱۸- کدامیک از زیرگروه های وسواس جنبه ژنتیک قویتری دارد؟

- WASHING (د) CHECKING (ج) SHOWERING (ب) HOARDING (الف)

۱۹- بیماری با علائم رده اول اشنایدری مراجعه کرده است. کدامیک از داروهای زیر با توجه به تشخیص های اصلی احتمالی، در درمان او نقشی ندارد؟

- د) رسپریدون (ج) بوسپیررون (ب) نورتریپتیلین (الف) لیتیوم

۲۰- به یک میدان بینایی بیمار دو نیمه مغز split brain، تصویری از او در حال شلیک به فرزندش نشان داده می شود. فرد می گوید چیزی نمی بیند. در عین حال رنگ او می پرد و با ناراحتی می گوید: "امکان ندارد". کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

- الف) تصویر به میدان بینایی راست تابانده شده است.
- ب) آنچه شاهدیم واکنش نیمکره راست مغز است.
- ج) این آزمایش نشانه نداشت تعامل ناکامل در کارکردهای مغز است.
- د) حالتهای متفاوت خودآگاهی مسبب انتقال دیدگاههای متنازع درونی از واقعیت به فرد است.

۲۱- در مورد نشانگان مونکهاوزن "Munchausen Syndrome" کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

- ب) انگیزه ایجاد نشانه ها جنبه ناخودآگاه دارد.
- د) درباره این نشانگان اطلاعات دقیق و کامل وجود ندارد.
- الف) شامل نشانه های جسمی یا روانی می تواند باشد.
- ج) به حد خطربناک نمی رسد و باعث مرگ نمی شود.

۲۲- بیمار به دنبال ابتلاء به رفتارهای بی سازمان و اختلال شدید تداعی تحت درمان مقتضی قرار گرفته است پس از یکسال از درمان دچار حرکات سریع شبیه جویدن شده است. این حرکات سریعتر و منظم تر از تیکهای دهانی - صورتی دیس کینزی دیررس و شبیه به تظاهر محدود ترمور پارکینسونی است. کدامیک از موارد زیر به تشخیص دقیق کمک می کند؟

- الف) سن بیمار (د) وجود سابقه خانوادگی مشبت (ب) عدم ابتلاء زبان (ج) جنسیت

۲۳- آقای ۲۸ ساله ای از طرف پزشکی قانونی جهت مشاوره به شما ارجاع می گردد. وی در پاسخ به سؤال شما که "چه شد که شما با تبر پدر خود را به قتل رساندید" عصبانی می شود و می گوید: "من فقط تبر به سر پدرم زدم، او خودش مرد" از نظر آسیب شناسی، چه مشکلی مطرح است؟

- ب) Dissociation of Emotion (د) Disturbance in Thought content (الف) Primary process Thinking (ج) Disturbance of perception

۲۴- در پدیده **duplication** بیماران احساس می کنند که بخشی از اعضاء یا تمامی بدن آنها دو تایی است مثلاً دو سر یا دو بدن دارند، این پدیده به غیر از اسکیزوفرنیا در کدام گروه از بیماریهای دیگر امکان وقوع دارد؟

(الف) C.P.S و میگرن
 (ب) C.P.S و انفارکتوس لب پاریتال
 (ج) ضایعات لب پاریتال و مسمومیت با سرب
 (د) میگرن و مصرف LSD

۲۵- هذیانهایی که معمولاً محدود یا منحصر به موضوعات مشخصی است و فرد به طور عادی از هوشیاری و آگاهی روشی برخوردار است و با توهمنات نیز همراه نیست، عبارت از:

(ب) Systematized delusions	(الف) Simple delusions
(د) Primary delusions	(ج) Complete delusions

۲۶- بیمار به هنگام مصاحبه، در پاسخ به سؤال درمانگر، مبنی بر اینکه "چه شد که بستری شدید" عباراتی را با سردرگمی و به صورت پراکنده درباره علت بستری شدنش می گوید اما به مرور از موضوع دور می شود و بدون بازگشت به موضوع سؤال می پرسد: "شما چه گفتید؟"، این علامت عبارتست از:

(د) tangentiality	(ج) loose of association	(ب) flight of ideas	(الف) blocking
-------------------	--------------------------	---------------------	----------------

۲۷- خانم ۴۰ ساله ای که از ۲۰ سال پیش زندگی متأهلی خود را شروع کرده است، علیرغم تمایل به تغییر منزل و بیش از ۱۰ بار قرارداد برای انتقال به خانه جدید، در مرحله اجرا از انجام کار سر باز می زند. او به کدام اختلال مبتلاست؟

(ب) Tropophobia	(الف) Technophobia
(د) Triskaidekaphobia	(ج) Thalassophobia

۲۸- برای دانشجوی پزشکی ۲۰ ساله که در امتحانات عملی دچار اضطراب می شود دارو تجویز شده است. به دنبال مصرف دارو نامبرده دچار خستگی، کابوسهای شبانه، بیخوابی و توهمند شده است. کدام یک از داروهای زیر کمتر از بقیه می تواند باعث علائم ذکر شده شود.

(د) آتنولول	(ج) پیندولول	(ب) متوبرولول	(الف) پروپرانول
-------------	--------------	---------------	-----------------

۲۹- کدام یک از موارد زیر در مصرف داروهای سایکوتروپیک از نظر FDA از عوارض خطیرناک محسوب نمی شود؟

(الف) عوارض قلبی عروقی و اختلالات هدایتی قلب در مصرف تیوریدازین

(ب) اختلال حاد کبدی در مصرف پمولین
(ج) التهاب میوکارد در مصرف کلوزاپین
(د) التهاب پانکراس در مصرف نفازدون

۳۰- در مصرف **Overdose** کدام دسته از داروهای آنتی سایکوتیک علائم دپرسیون CNS خواب آلودگی - کاهش فشار خون و عوارض مانند تغییرات در نوار قلب و آریتی قلبی، بی قراری - تشنج و خشکی و آژیتاسیون و بی قراری دیده می شود.

(ب) داروهایی که اثرات بیشتری روی گیرنده D2 دارند	(الف) داروهایی از گروه بوتیروفونهای
(د) داروهای high potency آتی پیک	(ج) داروهای low potency تیپیک

۳۱- علاوه بر زیپراسیدون، تجویز کدام آنتی سایکوتیک زیر بهمراه داروهای طولانی کننده QT انتروال ممنوع است؟

(الف) Lurasidone HCL
 (ب) Asenapine
 (ج) Olanzapine
 (د) Quetiapine

۳۲- کدام یک از داروهای زیر اثر ضدسایکوز دارد؟

الف) ترازودون

ب) بوپروپیون

ج) میرتازاپین

د) سرتالین

۳۳- دوز معمول نفازودون چند میلیگرم است؟

الف) ۴۰۰ میلی گرم

ب) ۲۰۰ میلی گرم

ج) ۴۵۰-۲۵۰ میلی گرم

د) ۶۰۰-۷۵۰ میلی گرم

۳۴- در استفاده از داروهای بوسپیرون کدام عبارت صحیح است؟

الف) در درمان سوء استفاده از الكل به علت تداخلات دارویی با الكل قابل استفاده نیست

ب) بوسپیرون موجب بدتر شدن آکاتیزیا و tardive می گردد

ج) بوسپیرون بر روی علائم حساسیت و تون عضلات در فیبرومیالژی اثرگذار است و در درمان کاربرد دارد

د) در درمان بیماران افسرده مقاوم به درمان همراهی بوسپیرون و SSRIs مفید می باشد و پاسخ درمانی را افزایش می دهد

۳۵- در درمان با لیتیوم کدام عبارت صحیح است؟

الف) در سالمدان به علت کاهش زمان و نیمه عمر دفعی دارو، دوز دارو باید کاهش داده شود

ب) لیتیوم از کاربامازپین و سدیم والپروئیت تراتوژن تر است و خطر بیشتری دارد

ج) در زمان رایمان در زنان باردار به علت جلوگیری از عود بهتر است دوز لیتیوم کاهش داده شود و قطع نگردد

د) در درمان با لیتیوم کمتر از ۱۰٪ بیماران عوارض جانبی جدی را تجربه نخواهند کرد

۳۶- در داروهای سه حلقه ای و چهار حلقه ای ضدافسردگی کدام عبارت صحیح است؟

الف) اثر مستقیم بر افزایش خلق دارند

ب) این داروها یوفوریا (سرخوشی) تولید می کنند

ج) دلیریوم ایجاد شده با این داروها وابسته به دوز نمی باشد

د) خطر تشنج ایجاد شده با این دسته داروها در همراه با نزولپتیکها افزایش می یابد

۳۷- داروهایی که هستند چه تاثیر فارماکولوژیکی دارند؟ Invers agonist

الف) اثرات pre synopitic antagonist دارند و تاثیر فارماکولوژیکی آگونیستی دارند

ب) اثرات post synaptic antagonist دارند و تاثیر فارماکولوژیکی آنتاگونیستی دارند

ج) اثرات synaptic antagonist دارند اما تاثیر فارماکولوژیکی آنتاگونیستی دارند

د) اثرات pre synopitic antagonist دارند و تاثیر فارماکولوژیکی آنتاگونیستی دارند

۳۸- کلونیدین از نظر فارماکودینامیکی چه تاثیری دارد؟

الف) pre synopitic α₂ adrenergic antagonist

ب) α₂ antagonist pre synopitic

د) α₂ agonist activity

ج) post synopitic α₂ adrenergic antagonist

۳۹- کدام یک جزء اندیکاسیون های کوتیاپین می باشد؟

الف) درمان نگهدارنده دوقطبی

ب) درمان نگهدارنده اسکیزوفرنی

د) درمان افسردگی دوقطبی

ج) درمان سایکوز در پارکینسون

۴۰- کدام یک از علائم آنتی کولینرژیک مرکزی نیست؟

الف) مردمک های باز شده

ب) اختلال حافظه

ج) برادیکاردی

د) بیوست

۴۱- در معاينه بيمار اسکيزوفرنيك كه به شكل غيرمعمول لباس پوشيده است، درمانگر متوجه مىشود كه او زير لب با خودش حرف مىزنند و با تردید به اطراف نگاه مىكنند، و به هنگام پاسخ گفتن به سوال درمانگر، ناگهان دچار وقهه کلام مىشود، کدام يك از وضعیت های فوق بیانگر علامت منفي است؟

- (الف) لباس پوشیدن غيرمعمول
(ب) زير لب سخن گفتن با خود
(ج) نگاه تردیدآميز به اطراف
(د) وقهه به هنگام صحبت

۴۲- بيمار مبتلا به اسکيزوفرنيا در حالیكه به آسمان چشم دوخته است با چشمک زدن ستاره‌اي مىگويد بالاخره زمان موعود فرارسيد و ستاره بخت من با چشمک زدن اعلام كرد كه به زودي همه چيز نابود مىشود و به آن معنى است كه من رهبري جهان را به عهده دارم. گفتار بيمار دلالت دارد بر:

- (الف) Delusional perception
(ب) Delusional memory
(ج) Delusion of grandure
(د) Delusion of being control

۴۳- برادر يك بيمار مبتلا به اسکيزوفرني از اختلال حافظه کلامي و روایتي شاکي است. به نظر شما در بررسی MRI مغز اين فرد کدام يك از یافته های زير وجود دارد؟

- (الف) کوچک شدن هيبيوكامپ
(ب) کوچک شدن حجم بطن ها
(ج) بزرگ شدن لوب تمپورال
(د) بزرگ شدن لوب پارتيال

۴۴- آقای ۲۳ساله دانشجو با اولین علائم اپي زود اسکيزوفرني مراجعه كرده است. کدام يك از گزينه ها بيشترین کمک را به بيمار مىكند؟

- (الف) درمان با آنتي ساپوتويك ها به مدت ۸ هفته و سپس کاهش داروها پس از کنترل علائم
(ب) دریافت درمان نگهدارنده به مدت ۲ سال بعد از کنترل علائم
(ج) عماه سپس از تثبيت وضعیت بيمار مىتوان داروها را کم کرد
(د) دریافت درمان نگهدارنده به مدت ۵ سال

۴۵- کدام يك از مدلهاي انتقال ژنتيكي در انتقال اختلال دوقطبی نقش ندارد؟

- (الف) Autosomal recessive
(ب) Additive
(ج) Epistatic
(د) heterogeneity

۴۶- بيمار خانم ۳۰ ساله که از افسرددگي رنج مىبرد و در تشخيص افتراقی مشخص نیست که فرد فاز افسرددگي يك بيماري دوقطبی را تجربه مىكند و يا افسرددگي تک قطبی است. در صورت وجود افسرددگي در کدام يك از دوره های فوق، وي از داروهای خواب آور نتيجه بهتری خواهد گرفت.

- (الف) فاز افسرددگي دوره اختلال دوقطبی
(ب) افسرددگي تک قطبی
(ج) در هر دو به يك ميزان نتيجه گرفته خواهد شد
(د) نياز به داروي خواب آور نمیباشد

۴۷- در فرضيه عدم تعادل آمين های بيوژنيك در اختلالات خلقي، عوامل سكس، لذت و عملکرد پسيکوموتور فرد به کدام آمين مرتبط است؟

- (الف) دوپامين
(ب) سروتونين
(ج) نورابي نفرين
(د) استيل كوليin

۴۸- وجود علائمی چون کاهش حرکات خودبخودی، حالت افتاده و نگاه رو به پایین و شکایت بیمار دال بر حالت و خوت و سستی در بیمار افسرده چگونه توجیه می‌شود؟

- الف) علائم فوق حاکی از کندی سایکوموتور است و به واسطه اختلال در ساب کورتیکال (سیستم اکسترپیرامیدال) است
ب) بیانگر کاهش علائق و ناتوانی در تجربه هیجانی به واسطه اختلال در عملکرد هیپوپalamوس است
ج) حاکی از وضعیت استوپور است و ناشی از کاهش حس ابتکار عمل و نقص کورتیکال است
د) بیانگر افسردگی پنهان است

۴۹- بیمار افسرده ای با سابقه اختلال دوقطبی در خانواده، مدت‌هاست به علت افسردگی تحت درمان قرار داد، وی که اخیراً به واسطه ابتلا به کولیت اولسروز تحت درمان با ۱۵ میلیگرم روزانه پردنیولون قرار گرفته است، پرحرف شده، خلقوش بالا رفته و پرتحرک شده است؛ تشخیص فعلی وی کدام است؟

- الف) اختلال بای پولار نوع دو
ب) اختلال بای پولار ۳
ج) اختلال هیپرتایمیک در زمینه افسردگی
د) اختلال بای پولار ۳/۵

۵۰- خانم ۲۵ ساله‌ای کرمانی با شکایت از عدم واکنش به همه محرک‌های لذت بخش قبلی، بیقراری قابل ملاحظه ذهنی و حرکتی، احساس گناه شدید در مورد زلزله بم و کاهش وزن قابل ملاحظه که اولین بار شش ماه پیش شروع شده بود برای اولین بار به شما مراجعه می‌کند. این مجموعه علائم با کدام یک از موارد یک اختلال افسردگی عمدی منطبق است؟

- الف) ملانکولیا
ب) آتیپیک
ج) فصلی
د) غیراختصاصی

به نام خدا

پاسخنامه امتحان کتبی دستیاران - دیماه ۹۳

سوال	الف	ب	ج	د
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				

نام و نام خانوادگی:

.....

با امید به موفقیت تمامی شما عزیزان،
لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- پاسخ‌ها حتماً به صورت (× ضربدر) و داخل کادر باشد.
- پاسخ‌ها با خودکار آئی یا مشکی مشخص شود.
- در صورت مشاهده بیشتر از یک پاسخ برای یک سوال، نمره‌ای به سوال مورد نظر تعلق نخواهد گرفت.

نمره کل:

.....

تأیید مسؤول آموزش دستیاری

تأیید مدیر گروه

					۴۸
					۴۹
					۵۰